Révision pour infection

Les « nouveaux » modes d'administration d'antibiothérapie locorégionale

Pr. Tristan Ferry

tristan.ferry@univ-lyon1.fr

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices Civils de Lyon
Université Claude Bernard Lyon1, Lyon

Centre International de Recherche en Infectiologie, CIRI, Inserm U1111, CNRS
UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1, Lyon, France

Centre Interrégional Rhône-Alpes Auvergne
de Référence des IOA complexes

Antibiotiques locaux

Quand le chirurgien orthopédiste « joue » à l'infectiologue

Shared care

Antibiotiques locaux

IOA = infection locale

Légitime de vouloir agir localement

Infectiologue

- Billes de gentamicine
- Chirurgie non optimal
- Faible relargage local
- Sans antibiothérapie systémique

Echec

**Acquisition
de résistance**

Rationnel pour l'utilisation d'antibiotique(s) locaux

Faibles/moyennes concentrations sur le site de l'infection

2

Fortes doses d'antibiotique IV ou oral pour traiter une infection locale

1

Patient exposé à un échec microbiologique

3

Rationnel pour l'utilisation d'antibiotique(s) locaux

En plus des antibiotiques systémiques
Pour obtenir de fortes [C] locales

Faibles/moyennes concentrations sur le site de l'infection

2

1

Fortes doses d'antibiotique IV ou oral pour traiter une infection locale

Patient exposé à un échec microbiologique

3

[C Locale]

Temps (jours)

Durée de vie des antibiotiques

Transporteur

Transporteur

Ciment
PMMA

Stratégie médico-chirurgicale au cours des infections de PTG

Ciments aux antibiotiques

Plusieurs objectifs

Spacer articulé

Pour traiter l'infection

Pour prévenir la surinfection

Pour faciliter la rééducation

Ciment utilisé pour la réimplantation

Pour traiter l'infection

Pour prévenir la surinfection

Pour fixer la prothèse

Concentrations locales

- Gentamicin 1g/40g in the COPAL G+C®
- Clindamycin 1g/40g in the COPAL G+C®
- ▲ Gentamicin 0,5g/40g in the PALACOS R+G®

Concentrations locales

Echelle logarithmique !

Gentamicin–vancomycin–colistin local antibiotherapy in a cement spacer in a 54-year-old haemophilic patient with relapsing plurimicrobial severe prosthetic joint infection

Tristan Ferry,^{1,2,3,4} Romain Desmarchelier,⁵ Sophie Magréault,^{6,7} Florent Valour,^{1,2,3,4} on behalf of the Lyon BJI Study group

Transporteur

Ciment
PMMA

Transporteur

Ciment
PMMA

Hydrogel

Does an Antibiotic-Loaded Hydrogel Coating Reduce Early Post-Surgical Infection After Joint Arthroplasty?

Carlo Luca Romanò¹✉, Kostantinos Malizos², Nicola Capuano³, Riccardo Mezzoprete⁴, Michele D'Arienzo⁵, Catherine Van Der Straeten^{6,7}, Sara Scarponi¹ and Lorenzo Drago^{8,9}

J. Bone Joint Infect. 2016

Does an Antibiotic-Loaded Hydrogel Coating Reduce Early Post-Surgical Infection after Total Hip or Knee Arthroplasty?

Carlo Luca Romandò¹, K...
D'Arienzo⁵, Catherine Va...

ete⁴, Michele

		Treated	%	
Joint	Hip	153	80.9	
	Knee	36	19.0	
Type of surgery	Primary	135	71.8	
	Revision	54	28.2	
Systemic prophylaxis	Cefazolin	69	48.2	
	Cefazolin + Glycopeptides	29	20.3	
	Cefazolin + Vancomycin	46	38.3	
	Vancomycin + Meropenem	45	31.5	
	DAC volume (mL)	Mean ± SD	8.3 ± 2.7	
		Min - Max	5 - 10	
DAC + vancomycin 5%		100	52.9	
DAC + gentamicin 3.2%		70	37.0	
DAC + vancomycin 2% + meropenem 2%		15	7.9	
Other associations		4	2.1

Does an Antibiotic-Loaded Hydrogel Coating Reduce Early Post-Surgical Infection after Total Hip or Knee Arthroplasty?

Carlo Luca Romandò¹, K...
D'Arienzo⁵, Catherine Va...

ete⁴, Michele

D

		Treated	%	
Joint	Hip	153	80.9	
	Knee	36	19.0	
Type of surgery	Primary	135	71.8	
	Revision	54	28.2	
Systemic prophylaxis	Cefazolin	69	48.2	
	Cefazolin + Glycopeptides	29	20.3	
	Cefazolin + Vancomycin	46	38.3	
	Vancomycin + Meropenem	45	31.5	
	DAC volume (mL)	Mean ± SD	8.3 ± 2.7	
		Min - Max	5 - 10	
	DAC + vancomycin 5%	100	52.9	
	DAC + gentamicin 3.2%	70	37.0	
	DAC + vancomycin 2% + meropenem 2%	15	7.9	
	Other associations	4	2.1

Transporteur

Ciment
PMMA

Hydrogel

Transporteur

Ciment
PMMA

Hydrogel

Pâte

Pharmacokinetics of gentamicin eluted from a regenerating bone graft substitute

IN VITRO AND CLINICAL RELEASE STUDIES

CERAMENT G™
Hydroxyapatite
Sulfate de calcium
Gentamicine

Régénération osseuse, Résorbable, sous forme de pâte

■ GENERAL ORTHOPAEDICS

Single-stage treatment of chronic osteomyelitis with a new absorbable, gentamicin-loaded, calcium sulphate/hydroxyapatite biocomposite

A PROSPECTIVE SERIES OF 100 CASES

Mac Nally M. et al.
Oxford Bone infection unit

Bone Joint J 2016;98-B:1289–96.

Pharmacokinetics of gentamicin eluted from a regenerating bone graft substitute

IN VITRO AND CLINICAL RELEASE STUDIES

CERAMENT G™
Hydroxyapatite
Sulfate de calcium
Gentamicine

Régénération osseuse, Résorbable, sous forme de pâte

■ GENERAL ORTHOPAEDICS

Single-stage treatment of chronic osteomyelitis with a new absorbable, gentamicin-loaded, calcium sulphate/hydroxyapatite biocomposite

A PROSPECTIVE SERIES OF 100 CASES

Mac Nally M. et al.

Oxford Bone infection unit

Bone Joint J 2016;98-B:1289–96.

Chirurgie en 1 temps

96% guérison

Homme de 62 ans. Fracture ouverte fémur distal il y a 20 ans, infection à *Pseudomonas*. Douleurs chroniques **mécaniques** sur arthrose handicapante. **CRP négative**, scintigraphie positive.

Indication de PTG

Séquelles d'ostéomyélite ?
Ostéomyélite chronique ?

PTG de 1^{ère} intention ?

PTG de résection ?

CERAMENT G™ & V™

***P. aeruginosa* en culture !**

3 mois d'antibiotiques systémiques

**Plus aucune
douleur à 6 mois**

Antibiothérapie locale

- Progrès considérables ces dernières années
- Nombreux « transporteurs »
- Combinaisons d'antibiotiques
- Fortes doses, exposition prolongée
- Importance des RCP CRIOAc pour déterminer la meilleure stratégie médico-chirurgicale
- Et choisir ensemble 🙌 😊 🙌 le bon antibiotique !

<http://www.crioac-lyon.fr>

- Published cases
- Open access studies in pdf
- All thesis in pdf
- **Newsletter**