Diagnostic des infections de prothèse basés sur les biomarqueurs locaux et circulants

Camille KOLENDA

Hôpital de la Croix Rousse – Institut des Agents Infectieux (IAI)
CIRI - Equipe « Pathogénie des infections à Staphylocoque » INSERM U1111

Tristan FERRY

Hôpital de la Croix Rousse – Service de Maladies Infectieuses
CRIOAc Lyon

Infections de prothèse

Le diagnostic c'est pas si facile ...

Challenge diagnostique

Difficultés cliniques

- Signes cliniques **aspécifiques**
- **Complexité** de la définition MSIS
- **Subjectivité** (purulence, interprétation de l'histologie)
- **Délai diagnostique** : culture

Biomarqueur

- Caractéristique **objectivement** mesurée, indicatrice de **processus biologiques** normaux ou pathologiques, ou de réponses pharmacologiques
- Marqueur idéal : **Exact, facile** d'utilisation, **rapide**

Centre de Référence des Infections Ostéo-Articulaires complexes CRIOAc

Centre de Référence des Infections Ostéo-Articulaires complexes CRIOAc

Réseau des CRIOAc Mandat 2017-2022

STAPHYLOCOQUES
Centre National de Référence

Pr. Tristan Ferry
MD, PhD
Infectiologist

Pr. Sébastien Lustig
MD, PhD
Orthopaedic surgeon

Pr. Frédéric Laurent
PharmD, PhD
Microbiologist

USP Lyon

**IAIQ
EBPN**

Inserm

CRB
Centre de Ressources Biologiques

ciri
Centre International de Recherche en Infectiologie

HCL
HOSPICES CIVILS DE LYON

Centre de Référence des Infections Ostéo-Articulaires

xes

BEDSIDE

The norm to manage complex BJI

MULTIDISCIPLINAR MEETING

- ◆ 2019
- ◆ 2018
- ◆ 2017
- ◆ 2016
- ◆ 2015

15% des patients avec infection possible de prothèse n'ont pas de diagnostic microbiologique

Quels biomarqueurs doser ?

SANG : Marqueurs de l'inflammation
(GB, VS, CRP, PCT, IL-6)

LIQUIDE ARTICULAIRE : GB, CRP, cytokines,
enzymes et peptides antimicrobiens

Quels biomarqueurs doser ?

SANG : Marqueurs de l'inflammation
(GB, VS, CRP, PCT, IL-6)

LIQUIDE ARTICULAIRE : GB, CRP, cytokines,
enzymes et peptides antimicrobiens

Critères majeurs (au moins un critère)		Décision
2 prélèvements positifs en culture (même agent pathogène)		Infection certaine
Fistule avec communication avec la prothèse		

Diagnostic préopératoire	Critères mineurs		Score	Décision	
	Sérum	CRP > 10 mg/L ou D-dimères > 860 ng/mL	2	≥ 6 infection certaine	
		VS > 30 mm/h	1		
	Synovial	Compte cellulaire avec > 3000 globules blancs/mL	3		2-5 infection possible
		Alpha-défensine élevée ou test positif	3		
		Pourcentage de polynucléaires neutrophiles > 80%	2		0-1 infection exclue
		CRP > 6,9 mg/L	1		

Diagnostic intraopératoire	Si le score préopératoire n'est pas concluant		Score	Décision
	Score préopératoire		-	≥ 6 infection certaine
	Histologie en faveur d'une infection		3	
	Aspect peropératoire macroscopique en faveur d'une infection avec purulence		3	4-5 infection possible
	Une seule culture positive		2	
			≤3 infection exclue	

Critères majeurs (au moins un critère)		Décision
2 prélèvements positifs en culture (même agent pathogène)		Infection certaine
Fistule avec communication avec la prothèse		

Diagnostic préopératoire	Critères mineurs		Score	Décision
	Sérum	CRP > 10 mg/L ou D-dimères > 860 ng/mL	2	≥ 6 infection certaine 2-5 infection possible 0-1 infection exclue
		VS > 30 mm/h	1	
	Synovial	Compte cellulaire avec > 3000 globules blancs/ml	3	
		Alpha-défensine élevée ou test positif	3	
		Pourcentage de polynucléaires neutrophiles > 80%	2	
CRP > 6,9 mg/L		1		

Diagnostic intraopératoire	Si le score préopératoire n'est pas concluant		Score	Décision
	Score préopératoire		-	≥ 6 infection certaine
	Histologie en faveur d'une infection		3	
	Aspect peropératoire macroscopique en faveur d'une infection avec purulence		3	4-5 infection possible ≤3 infection exclue
	Une seule culture positive		2	

Critères majeurs (au moins un critère)		Décision
2 prélèvements positifs en culture (même agent pathogène)		Infection certaine
Fistule avec communication avec la prothèse		

Diagnostic préopératoire	Critères mineurs		Score	Décision	
	Sérum	CRP > 10 mg/L ou D-dimères > 860 ng/mL	2	≥ 6 infection certaine	
		VS > 30 mm/h	1		
	Synovial	Compte cellulaire avec > 3000 globules blancs/mL	3		2-5 infection possible
		Alpha-défensine élevée ou test positif	3		
		Pourcentage de polynucléaires neutrophiles > 80%	2		0-1 infection exclue
CRP > 6,9 mg/L		1			

Diagnostic intraopératoire	Si le score préopératoire n'est pas concluant		Score	Décision
	Score préopératoire		-	≥ 6 infection certaine
	Histologie en faveur d'une infection		3	
	Aspect peropératoire macroscopique en faveur d'une infection avec purulence		3	4-5 infection possible
	Une seule culture positive		2	
			≤3 infection exclue

α -defensine

α -Defensin Accuracy to Diagnose Periprosthetic Joint Infection—Best Available Test?

Salvatore J. Frangiamore, MD, MS^a, Nicholas D. Gajewski, BS^b, Anas Saleh, MD^a, Mario Farias-Kovac, MD^a, Wael K. Barsoum, MD^a, Carlos A. Higuera, MD^a *The Journal of Arthroplasty* 31 (2016) 456–460

78 prélèvements dont 24 infections de prothèse.
Sensibilité : 100%, Spécificité : 98%

The Alpha Defensin-1 Biomarker Assay can be Used to Evaluate the Potentially Infected Total Joint Arthroplasty

Joshua Bingham MD, Henry Clarke MD, Mark Spangehl MD, Adam Schwartz MD, Christopher Beauchamp MD, Brynn Goldberg RN
Clin Orthop Relat Res (2014)

61 prélèvements dont 19 infections de prothèse.
Sensibilité : 100%, Spécificité : 95%

The Alpha-defensin Test for Periprosthetic Joint Infection Responds to a Wide Spectrum of Organisms

Carl Deirmengian MD, Keith Kardos PhD, Patrick Kilmartin MS, Simmi Gulati MS, Patrick Citrano BS, Robert E. Booth Jr MD
Clin Orthop Relat Res (2015)

The Alpha-defensin Test for Periprosthetic Joint Infections Is Not Affected by Prior Antibiotic Administration

Alisina Shahi MD, Javad Parvizi MD, FRCS, Gregory S. Kazarian AB, Carlos Higuera MD, Salvatore Frangiamore MD, Joshua Bingham MD, Christopher Beauchamp MD, Craig Della Valle MD, Carl Deirmengian MD
Clin Orthop Relat Res (2016)

Combined Measurement of Synovial Fluid α -Defensin and C-Reactive Protein Levels: Highly Accurate for Diagnosing Periprosthetic Joint Infection

Carl Deirmengian, MD, Keith Kardos, PhD, Patrick Kilmartin, MSc, Alexander Cameron, BS, Kevin Schiller, BS, and Javad Parvizi, MD, FRCS

Sensibilité : 97,3% , Spécificité 95,5%

Algorithme : Analyse de la sCRP
si α -defensine +

Sensibilité : 97,3% , Spécificité 100%

Autre marqueur synoviaux ?

Souhait d'avoir à disposition un autre biomarqueur plus sensible au laboratoire pour toute suspicion d'infection de prothèse, avec rendu si possible dans la semaine

- Calprotectine
- IL-6

■ ARTHROPLASTY

Synovial calprotectin

A POTENTIAL BIOMARKER TO EXCLUDE A PROSTHETIC JOINT INFECTION

Table II. Characteristics of patients with a prosthetic joint infection (PJI) and controls without an infection.

PJI group (n = 19)	Control group (n = 42)
Acute PJI (n = 10)	Native joint
Polymicrobial (n = 4)	Primary joint arthroplasty (n = 17)
<i>S. epidermidis</i> (n = 2)	Osteoarthritis (n = 9)
<i>S. aureus</i> (n = 1)	Malignancy (n = 5)
<i>Escherichia coli</i> (n = 1)	Fracture (n = 1)
<i>E. faecalis</i> (n = 1)	Malignancy and fracture (n = 1)
<i>S. lugdunensis</i> (n = 1)	Cyst (n = 1)
Chronic PJI (n = 9)	Spacer
<i>S. epidermidis</i> (n = 4)	Before reimplantation (n = 9)
<i>P. acnes</i> (n = 2)	Prosthetic joint
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (n = 1)	Aseptic loosening prosthesis (n = 7)
<i>Streptococcus mutans</i> (n = 1)	Painful prosthesis (n = 9)
Polymicrobial (n = 1)	

S., *Staphylococcus*; *E.*, *Enterococcus*; *P.*, *Propionibacterium*

■ ARTHROPLASTY

Synovial calprotectin

A POTENTIAL BIOMARKER TO EXCLUDE A PROSTHETIC JOINT INFECTION

■ ARTHROPLASTY

Synovial calprotectin

A POTENTIAL BIOMARKER TO EXCLUDE A PROSTHETIC JOINT INFECTION

Fig. 2

Receiver operating characteristic (ROC) curve of the synovial levels of calprotectin for diagnosing a prosthetic joint infection using a cutoff value of 50 mg/L (AUC, area under the curve).

Table III. Diagnostic accuracy of synovial calprotectin for the diagnosis of a prosthetic joint infection. Cutoff value: 50 mg/L

Synovial calprotectin	Overall	Acute PJI	Chronic PJI
Sensitivity (%)	89 (95% CI 0.69 to 0.98)	90 (95% CI 0.60 to 0.99)	89 (95% CI 0.57 to 0.99)
Specificity (%)	90 (95% CI 0.78 to 0.96)	90 (95% CI 0.78 to 0.96)	90 (95% CI 0.78 to 0.96)
Positive predictive value (%)	81 (95% CI 0.60 to 0.92)	69 (95% CI 0.42 to 0.87)	67 (95% CI 0.39 to 0.86)
Negative predictive value (%)	95 (95% CI 0.84 to 0.99)	97 (95% CI 0.87 to 1.0)	97 (95% CI 0.87 to 1.0)
Positive likelihood ratio	8.9 (95% CI 3.1 to 24.5)	9.0 (95% CI 2.7 to 24.8)	8.9 (95% CI 2.6 to 24.8)
Negative likelihood ratio	0.1 (95% CI 0.02 to 0.4)	0.1 (95% CI 0.01 to 0.51)	0.1 (95% CI 0.23 to 0.55)

CI, confidence interval

Table IV. Proposed clinical interpretation of synovial calprotectin values for the diagnosis of a prosthetic joint infection

Synovial calprotectin	Interpretation
> 275 mg/L	High suspicion for infection
50 to 275 mg/L	Borderline suspicion for infection
< 50 mg/L	Low suspicion for infection

Diagnostic Utility of a Novel Point-of-Care Test of Calprotectin for Periprosthetic Joint Infection After Total Knee Arthroplasty: A Prospective Cohort Study

Jared Warren ¹, Hiba K Anis ¹, Kathleen Bowers ¹, Tejbir Pannu ², Jesus Villa ², Alison K Klika ¹, Jessica Colon-Franco ¹, Nicolas S Piuze ¹, Carlos A Higuera ²

- **Results:** According to the MSIS criteria, 53 revision TKAs were septic and 70 revision TKAs were aseptic. In the ≥ 50 -mg/mL threshold scenario, the calprotectin POC performance showed a sensitivity of 98.1%, a specificity of 95.7%, a positive predictive value of 94.5%, a negative predictive value of 98.5%, and an AUC of 0.969. In the ≥ 14 -mg/mL threshold scenario, the sensitivity was 98.1%, the specificity was 87.1%, the positive predictive value was 85.2%, the negative predictive value was 98.4%, and the AUC was 0.926.
- **Conclusions:** The calprotectin POC test has excellent PJI diagnostic characteristics, including high sensitivity and specificity in patients undergoing revision TKA. This test could be effectively implemented as a rule-out test. However, further investigations with larger cohorts are necessary to validate these results.

ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

The Journal of Arthroplasty

journal homepage: www.arthroplastyjournal.org

Synovial IL-6 AS Inflammatory Marker in Periprosthetic Joint Infections

Markus Lenski, Cand. med.^{a,b}, Michael A. Scherer, Dr. med.^a

^a Department of Orthopedics and Trauma Surgery, Klinikum Dachau, Academic Teaching Hospital of the Ludwig-Maximilians-University of Munich, 7 Krankenhausstraße 15, 85221 Dachau, Germany

^b Faculty of Medicine, Technical University of Munich, Munich, Germany

69 patients dont 31 infections de prothèse

	Number	Mean	AUC	Cutoff	SE	SP	+LR	-LR
IL-6 (pg/ml)	n = 22	308,099	0,959	30,750	90.9% (72.2-97.5)	94.7% (75.4-99.1)	17.27 (2.55-116.9)	0.10 (0.03-0.36)
Glucose (mg/dL)	n = 24	30.4	0.829	44.0	79.2% (59.5-90.8)	78.6% (60.5-89.8)	3.69 (1.77-7.73)	0.27 (0.12-0.59)
Lactate (mmol/L)	n = 21	12.8	0.844	8.3	71.4% (50.0-86.2)	88.0% (70.0-95.8)	5.95 (1.99-17.80)	0.33 (0.16-0.65)
SFWBC ($\times 10^3/\mu\text{L}$)	n = 25	69.6	0.807	23.0	60.0% (40.7-76.6)	94.3% (81.4-98.4)	10.50 (2.63-41.87)	0.42 (0.26-0.69)
LDH (U/l)	n = 25	4918	0.779	1423	84.0% (65.4-93.6)	62.1% (44.0-73)	2.22 (1.35-3.64)	0.26 (0.10-0.66)
CRP _{serum} (mg/dl)	n = 30	13.4	0.768	0.5	93.3% (78.7-98.2)	21.4% (10.2-39.5)	1.19 (0.96-1.47)	0.31 (0.07-1.42)
pWBC ($\times 10^3/\mu\text{L}$)	n = 30	11.1	0.676	11.5	40.0% (24.6-57.7)	83.9% (67.4-92.9)	2.48 (0.99-6.19)	0.72 (0.51-1.00)

Interleukin-6 in Serum and in Synovial Fluid Enhances the Differentiation between Periprosthetic Joint Infection and Aseptic Loosening

Thomas M. Randau^{1,3}, Max J. Friedrich^{1,3}, Matthias D. Wimmer¹, Ben Reichert¹, Dominik Kuberra¹, Birgit Stoffel-Wagner², Andreas Limmer¹, Dieter C. Wirtz¹, Sascha Gravius^{1*}

Parameter	AUC (95% CI)	Cut-Off	Sensitivity (95% CI)	Specificity (95% CI)
WBC	0,63 (0,53 to 0,73)	10'300/ μ l	21,28% (10,70%–35,66%)	94,44% (86,38%–98,47%)
CRP	0,73 (0,64 to 0,83)	>9.1 mg/l	61,70% (46,38%–75,49%)	82,61 (71,59%–90,68%)
PCT	0,65 (0,51 to 0,80)	>46 ng/ml	12,90% (3,630%–29,83%)	100,0% (86,28%–100,0%)
IL-6 Serum	0,72 (0,61 to 0,83)	>2.6 pg/ml	79,49% (63,54%–90,70%)	58,33% (44,88%–70,93%)
		>6.6 pg/ml	48,72% (32,42%–65,22%)	88,33% (77,43%–95,18%)
IL-6 Joint Aspirate	0,76 (0,64 to 0,88)	>2100 pg/ml	62,50% (43,69%–78,90%)	85,71% (71,46%–94,57%)
		>9000 pg/ml	46,88% (29,09%–65,26%)	97,62% (87,43%–99,94%)

Même technique, deux seuils bien différents !

	Number	Mean	AUC	Cutoff	SE	SP
IL-6 (pg/ml)	n = 22	308,099	0.959	30,750	90.9% (72.2–97.5)	94.7% (75.4–99.1)

Faible valeur ajoutée de l'IL6 synoviale versus sang ? ?

Limites de ces études

- La **définition d'une infection de prothèse** paraît facile ... pourtant sans gold standard
- Populations **hétérogènes** :
 - Critères de définition de l'infection de prothèse
 - Articulation
 - Infection précoce/tardive
 - Critères d'exclusion (maladie inflammatoire chronique, traitement antibiotique antérieur etc.)
- **Peu d'études multicentriques**
- **Techniques** différentes, **seuils** différents
- Nombre de patients limité, avec données manquantes

Place en routine des marqueurs synoviaux ?

- **Quel marqueur pour quel coût ?**
 - CRP : < 5€ ?
 - alpha-défensine : 300€ pour le test commercial, voir le coût pour un dosage au laboratoire
 - Calprotectine ?
 - IL6 ?
- **Pour qui ?**
 - Pour tous les patients avec prothèse articulaire pour qui une analyse cytologique et cytochimique du liquide est demandé
- **Quand ?**
 - Préopératoire : ponction préopératoire
 - Peropératoire : analyse peropératoire du liquide
- **Quel délai pour le résultat ?**
 - Une semaine est un délai de rendu raisonnable

Conclusion

- Des biomarqueurs **synoviaux apparaissant dans les recommandations pour le diagnostic d'infection su prothèse (à mettre en place rapidement aux HCL ?)** :
 - CRP
 - Alphadéfensine
- Un **marqueur additionnel synovial prometteur** pour lequel nous sommes demandeurs :
 - Calprotectine ++ (ou IL-6)

Recrutement CRIOAc Lyon avec des cas difficiles pour lesquels les marqueurs classiques d'infection sont plus facilement pris en défaut

Projet d'études de cohortes au cours desquelles ces marqueurs pourront être évalués au sein des patients recrutés au CRIOAc Lyon