Cas clinique

infection précoce de prothèse articulaire

Solene Patrat-Delon

Service de maladies infectieuses et réanimation médicale

CHU Pontchaillou – Rennes

Ateliers DIU-IOA 2020-2021

- Mme V. Irène, 46 ans.
- Consulte à **J18** d'une PTH G pour:
 - Fièvre 38,4°
 - Ecoulement purulent de cicatrice
 - Douleur à la mobilisation du MIDt
- Question 1 : Quel(s) sont les examen(s) complémentaire(s) nécessaire(s)?

- Les signes d'alerte en faveur d'une infection précoce de prothèse:
 - Écoulement purulent
 - Inflammation, désunion, nécrose de cicatrice
 - Fistule
 - Douleur anormale, ou qui survient secondairement
 - Signes généraux (fièvre post op $\neq$ infection)

- Question 1 : Quel(s) sont les examen(s) complémentaire(s) nécessaire(s)?
 - Une radiographie

- Et une hémoculture

- Radiographie des suspicions d'infections précoces de prothèse:
 - Recherche une cause mécanique aux douleurs
- Et sur le plan biologique?
 - CRP? Simple, pas cher, sensible... mais pas du tout spécifique

Recommandation 4

AE

Il est recommandé de réaliser un dosage du taux sérique de la CRP devant l'existence de signes cliniques évocateurs.

Si le diagnostic n'est pas établi, il est recommandé de répéter le dosage du taux sérique de la CRP.

En post-op: CRP augmentée , $\searrow$ dans 1^{er} mois

Si réaugmentation? Toujours faible spécificité

(Kim, J of arthroplasty 2016: 577 PTG, CRP suivi pdt 1 mois post op: 76 réaugmentation CRP, 26% d'infection)

- Ponction articulaire? Inutile si diagnostic est évident

Mise en place de la prothèse

- Question 2 : quelle PEC préconisez-vous ? sur le plan chirurgical et médical

→ ***Décision d'une reprise chirurgicale***

Quelle chirurgie?

Quelle ATB post-opératoire?

- Question 2 : quelle PEC préconisez-vous ? sur le plan chirurgical et médical

→ ***Décision d'une reprise chirurgicale***

Quelle chirurgie?

- Synovectomie + changement complet en 1 temps (pas d'ostéo-intégration)
- Synovectomie complète + changement des pièces mobiles avec conservation des implants si cimentés

- Synovectomie + changement de toute pièce mobile (toute la PTH en précoce)

- Synovectomie complète macroscopiquement ++
- À « ciel ouvert » = arthrotomie*
- Changement des pièces mobiles *
- Si mobilité à la jonction os/implant → changement de prothèse *
- Drains
- Succès très variable : 40 à 90%

- Quel risque prend-on à faire un débridement, rétention de la prothèse?
 - Risque d'échec + important
 - Il semble qu'en cas d'échec de DAIR pour infection de PTG, + d'échec attendu si changement de PTG 2ndaire

- Question 2 : quelle PEC préconisez-vous ? sur le plan chirurgical et médical

→ ***Décision d'une reprise chirurgicale + ATB***

Quelle ATB post-opératoire?

- Pipéracilline/tazobactam (4gr/8h) + Linezolide 600mg x2/jour

- ATB post opératoire doit:
 - Couvrir les germes attendus (et doit s'adapter à l'écologie du service)
 - Pour une toxicité minimale
 - Bactéricide

Recommandation 20

AE	Il est recommandé de prescrire : vancomycine et pipéracilline-tazobactam ou vancomycine et céphalosporine de 3 ^e génération (ceftriaxone ou cefotaxime) en attendant l'identification microbiologique.
-----------	---

Tableau 1. Proposition de traitement antibiotique probabiliste

ATB	Doses
Vancomycine*	1 000 mg IVL en 1 h (1 250 mg en 1 h - 1 h 30 si poids 80-100 kg ; 1 500 mg si poids > 100 kg)/12 h Réaliser un dosage du taux résiduel à la 72e heure si le traitement est poursuivi pour adapter la dose (objectif de taux résiduel à 20-30 mg/L)
Pipéracilline-tazobactam	4 g IVL/8 h (toutes les 6 h si poids >100 kg)
Cefotaxime	2 g IVL/8 h (3 g/8 h si poids 70-100 kg ; 3 g/6 h si poids > 100 kg)
Ceftriaxone	2 g IVL/24 h (1,5 g/12 h si poids 70-100 kg ; 2 g/12 h si poids > 100 kg)

- Bactériologie attendue: CMR 2014

TABLE 1 Common causes of prosthetic joint infection

Infection	% of patients with prosthetic joint infection		
	Hip and knee		
	All time periods ^a	Early infection ^b	
<i>Staphylococcus aureus</i>	27	38	75% CG+
Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i>	27	22	
<i>Streptococcus</i> species	8	4	
<i>Enterococcus</i> species	3	10	
Aerobic Gram-negative bacilli	9	24	25% BGN
Anaerobic bacteria	4	3	
<i>Propionibacterium acnes</i>			
Other anaerobes			
Culture negative	14	10	
Polymicrobial	15	31	30% polymicrobien
Other	3		

- Bactériologie attendue: Triffault-Fillit, CMI 2018

Et 27% polymicrobien

- Mais association PIPERACILLINE-TAZOBACTAM + VANCOMYCINE = plus de toxicité rénale

- Autre proposition:
 - PIPERACILLINE-TAZOBACTAM + LINEZOLIDE
 - PIPERACILLINE-TAZOBACTAM + DAPTOMYCINE
 - ...

- 3/3 prélèvements + *E. coli* de phénotype sauvage

Amox.....S

Amox/ac clav.....S

Cefotaxime.....S

Amikacine.....S

Fosfomycine.....S

Cotrimoxazole.....S

Ac nalidixiqueS

OfloxacineS

Ciprofloxacine.....S

- Question 3 : quelle adaptation ATB préconisez-vous ?

- Question 3 : quelle adaptation ATB préconisez-vous ?

→ AMOXICILLINE 150 à 200mg/kg/jour en continu

ou pas... relai précoce possible → étude **OVIVA**

- OVIVA (NEJM HK Li 2019):
 - RCT prospectif
 - 1054 patients
 - Relai oral J7 ou >7j : non infériorité

ORIGINAL ARTICLE

Oral versus Intravenous Antibiotics for Bone and Joint Infection

- À noter: que 168 infection à BGN non *Pseudomonas*

Organisms identified — no./total no. (%)§

<i>Staphylococcus aureus</i>	196/500 (39.2)	182/503 (36.2)	378/1003 (37.7)
Coagulase-negative staphylococcus	137/500 (27.4)	135/503 (26.8)	272/1003 (27.1)
Streptococcus species	72/500 (14.4)	73/503 (14.5)	145/1003 (14.5)
<i>Pseudomonas</i> species	28/500 (5.6)	23/503 (4.6)	51/1003 (5.1)
Other gram-negative organisms	84/500 (16.8)	84/503 (16.7)	168/1003 (16.7)
Culture negative	77/500 (15.4)	78/503 (15.5)	155/1003 (15.5)

- Question 3 : quelle adaptation ATB préconisez-vous ?

→ AMOXICILLINE 150 à 200mg/kg/jour en continu (ou pas... relai précoce possible)

→ relai oral par FLUOROQUINOLONE seule

→ pendant 12 semaines au total (étude **DATIPO**)

Gram-negative prosthetic joint infection: outcome of a debridement, antibiotics and implant retention approach. A large multicentre study

Nette influence des quinolones sur le succès clinique

- **DATIPO:**

- RCT ouvert, multicentrique, ouvert
- 6 vs 12 semaines d'ATB/ IPOA avec changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps long) ou non (lavage articulaire)
- 40% lavage / 37% 1 temps / 20% 2 temps

→ Non infériorité non démontrée

- Nb: toujours moins d'infection à BGN (9% entérobactéries, 41 IPOA)

- Question 4 : la patiente s'interroge sur cette infection nosocomiale : aurait-elle pu être évitée ? sa voisine a eu un ECBU avant la pose de sa PTH... et pas elle. Et pourtant elle sait que *E coli* est un germe urinaire!
 - Information sur risque d'ISO après PTH
 - Sur facteur de risque connus, voire modifiables
 - Information sur les mesures prises pour éviter les ISO: ATBprophylaxie, hygiène, ... quid de l'ECBU pre op?

- Facteurs de risque :
 - Sexe masculin
 - Age élevé
 - IMC > 30kg/m² (surtout pour PTH)
 - tabac

- Acdt de chirurgie articulaire
- Comorbidités (diabète, PR surtout si antiTNF, démence, BPCO, IC, cirrhose)
- ASA >2 (dans les 6 1^{er} mois)

- Liés au centre (pas toujours retrouvé)
- Temps opératoire >2,5h
- Hématome post op

- LID 2018, Lenguerrand:
 - etude observationnelle prospective,
 - 1^{ère} PTH, entre 2003 et 2014
 - >500000 PTH
 - Infection = / dont 14% dans les 3 1^{er} mois

- Et mon ECBU doc?!

Reco spilf/AFU/SF2H 2015

R.25. Il est recommandé de ne pas dépister et de ne pas traiter les colonisations urinaires avant arthroplastie réglée de hanche ou de genou (D-II).

- Sousa, CID 2014, Is asymptomatic bacteriuria a risk factor for prosthetic joint infection?

- Étude de cohort multicentrique, prospective – PTH PTG
 - 2497 patients/ 12,1% de bactériurie asymptomatique
 - Infection de prothèse =
 - 1,4 vs 4,3% si bactériurie preop
 - + d'infection à BGN
 - Même taux d'infection si ttt préop de la bactériurie ou non (4,7 vs 3,9%)
 - Mais pas les mêmes souches entre urines preop et infection de prothèse
- Bactériurie est un marqueur de risque d'infection post op/ pas de benefice au ttt ATB (et donc au dépistage pré op)

Conclusions des IOA précoces

- Diagnostic à faire en urgence +++
 - Éviter les examens inutiles: hémoculture, Rx, +/- ponction articulaire
 - Toute anomalie en post-opératoire doit faire consulter le chirurgien en urgence
- PEC médico-chirurgicale:
 - Lavage-synovectomie complète + changement « de tout ce qui bouge »
 - ATB large spectre en probabiliste, sans aminosides sauf si sepsis sévère
- Traitement oral de référence, précoce possible:
 - Fluoroquinolone pour IOA à BGN
 - Rifampicine + fluoroquinolone pour IOA à Staphylocoque