Les infections ostéo-articulaires (IOA) en 2020

Pr. Tristan Ferry
tristan.ferry@univ-lyon1.fr

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices Civils de Lyon
Université Claude Bernard Lyon1, Lyon

Centre International de Recherche en Infectiologie, CIRI, Inserm U1111, CNRS
UMR5308, ENS de Lyon, UCBL1, Lyon, France

Centre Interrégional Rhône-Alpes Auvergne
de Référence des IOA complexes

Les infections ostéoarticulaires

- Infections hétérogènes
- Epidémiologie bactérienne variable
- Incidence 'faible'
- Différentes stratégies
- La stratégie et les comorbidités influencent le pronostic
- Pourcentage de succès faible dans certaines situations cliniques
- Coût considérable (individuel et collectif)

Les infections ostéoarticulaires

Lew et al. *NEJM* 1997

- Infections hétérogènes
- Epidémiologie bactérienne variable
- Incidence 'faible'
- Différentes stratégies
- La stratégie et les comorbidités influencent le pronostic
- Pourcentage de succès faible dans certaines situations cliniques
- Coût considérable (individuel et collectif)
- Peu d'essai clinique
- Peu de molécules anti-infectieuses approuvées

Les infections ostéoarticulaires

NIH U.S. National Library of Medicine

ClinicalTrials.gov

- **Osteomyelitis: 68**
- **Prosthetic-joint infection: 47**
- Meningitis: 348
- Urinary tract infection: 492
- Tuberculosis: 915
- Influenza: 2'152

Les infections ostéoarticulaires

NIH U.S. National Library of Medicine

ClinicalTrials.gov

Lew et al. *NEJM* 1997

- **Osteomyelitis: 68**
- **Prosthetic-joint infection: 47**
- Meningitis: 348
- Urinary tract infection: 492
- Tuberculosis: 915
- Influenza: 2'152

**Les IOA :
Maladies infectieuses négligées
des pays industrialisés**

Recommandations et IOA

Centre de Référence des Infections
Ostéo-articulaires Complexes

[Accueil](#) [Le Centre](#) ▼ [Equipes](#) ▼ [Prise en charge](#) ▼ [RCP](#) ▼ [Centres correspondants](#) ▼ [Recherche](#) ▼ [Enseignement](#) ▼ [Infos pratiques](#) ▼ [Liens](#)

D'autres recommandations Françaises sont disponibles :

- ▶ [Recommandations de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française \(SPILF\) sur les infections sur matériel 2009 \(texte court\)](#)
- ▶ [Recommandations de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française \(SPILF\) sur les infections sur matériel 2009 \(texte long\)](#)
- ▶ [Recommandations sur les spondylodiscites datant de 2007 \(texte long\)](#)
- ▶ [Recommandations sur les spondylodiscites datant de 2007 \(texte court\)](#)
- ▶ [Prise en charge du pied diabétique datant de 2005 \(texte court\)](#)
- ▶ [Prise en charge du pied diabétique datant de 2005 \(texte long\)](#)

Il existe également des recommandations Américaines, publiées sous l'égide de l'Infectious Diseases Society of America.
Parmi elles :

- ▶ [Recommandations de prise en charge des infections de prothèse articulaire ont été publiées en 2012](#)
- ▶ [Recommandations de prise en charge des spondylodiscites aiguës en 2015](#)

Recommandations ICM Philly

Centre de Référence des Infections
Ostéo-articulaires Complexes

[Accueil](#) [Le Centre](#) [Equipes](#) [Prise en charge](#) [RCP](#) [Centres correspondants](#) [Recherche](#) [Enseignement](#) [Infos pratiques](#) [Liens](#)

Recommandations Internationales de l'International Consensus Meeting ICM Philly :

- [▶ Front Matter](#)
- [▶ General and \[▶ Biofilm\]\(#\)](#)
- [▶ Foot and Ankle](#)
- [▶ Hip and Knee](#)
- [▶ Oncology](#)
- [▶ Pediatrics](#)
- [▶ Shoulder and \[▶ Elbow\]\(#\)](#)
- [▶ Spine](#)
- [▶ Sports](#)
- [▶ Trauma](#)

2018

Second **INTERNATIONAL
CONSENSUS MEETING (ICM)**
on **MUSCULOSKELETAL INFECTION**

2007

Recommandations pour la Pratique Clinique

**Spondylodiscites infectieuses primitives, et secondaires à un geste intra-discal,
sans mise en place de matériel**

Organisées par

La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF)

avec la participation des organismes et sociétés savantes

Collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales

Société française de rhumatologie

Société française de microbiologie

Société française de radiologie

Société française de neuro-chirurgie

Société française de médecine physique et réadaptation

2014

Recommandation de bonne pratique
Prothèse de hanche ou de genou :
diagnostic et prise en charge de l'infection
dans le mois suivant l'implantation

2009

Recommandations de pratique clinique
Infections ostéo-articulaires sur matériel
(prothèse, implant, ostéo-synthèse)

2013

Diagnosis and Management of Prosthetic Joint Infection: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America^a

Douglas R. Osmon,¹ Elie F. Berbari,¹ Anthony R. Berendt,² Daniel Lew,³ Werner Zimmerli,⁴ James M. Steckelberg,¹ Nalini Rao,^{5,6} Arlen Hanssen,⁷ and Walter R. Wilson¹

¹Division of Infectious Diseases, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota; ²Bone Infection Unit, Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford University Hospitals NHS Trust, United Kingdom; ³Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, University of Geneva Hospitals; ⁴Basel University Medical Clinic, Liestal, Switzerland; ⁵Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, and ⁶Department of Orthopaedic Surgery, University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, and ⁷Department of Orthopedics, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota

Consensus document

2017

Management of prosthetic joint infections. Clinical practice guidelines by the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC)

Javier Ariza Cardenal^a, Javier Cobo Reinoso^{b,*}, Josu Baraia-Etxaburu Artetxe^c, Natividad de Benito Hernández^d, Guillermo Bori Tuneu^e, Javier Cabo^f, Pablo Corona Pérez-Cardona^g, Jaime Esteban Moreno^h, Juan Pablo Horcajada Gallegoⁱ, Jaime Lora-Tamayo Morillo-Velarde^j, Óscar Murillo Rubio^k, Julián Palomino Nicás^l, Jorge Parra Ruiz^m, Carlos Pigrau Serrallachⁿ, José Luis del Pozo León^o, Melchor Riera Jaume^p, Dolores Rodríguez Pardo^q, Mar Sánchez-Somolinos^r, Álex Soriano Viladomiu^s, María Dolores del Toro López^t y Basilio de la Torre Escudero^u

Infection
d'un os ou d'une articulation
par
1 ou plusieurs micro-organismes
(**bactérie** ou champignon)

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

**IOA souvent localisée aux
Membres inférieurs**

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de micro-organisme

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de micro-organisme

Bactéries

- Cocci à Gram positif
 - *Staphylococcus aureus*
 - Staphylococcus à coagulase négatif
 - Staphylococcus epidermidis*
 - Staphylococcus haemolyticus*
 - Staphylococcus hominis*
 - ...
- *Propionibacterium acnes* (bacille anaérobie)
- Streptocoques
- Entérocoques

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de micro-organisme

Bactéries

- Cocci à Gram positif

- *Staphylococcus aureus*

- *Staphylococcus* à coagulase négatif

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

...

- *Propionibacterium acnes*

- Streptocoques

- Entérocoques

Croissance lente ou rapide
Infections

Aigües ou chroniques

Avec ou sans matériel

Récidives +++

Croissance plus lente

Infections chroniques

Plus souvent sur matériel

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de micro-organisme

Bactéries

- Cocci à Gram positif
 - ***Staphylococcus aureus***
 - **Staphylococcus à coagulase négatif**
 - Staphylococcus epidermidis*
 - Staphylococcus haemolyticus*
 - Staphylococcus hominis*
 - ...
 - ***Propionibacterium acnes***
- Streptocoques
- Entérocoques
- Bacille à Gram négatif
 - Entérobactéries
 - Escherichia coli*
 - Klebsiella pneumoniae*

Levures

- *Candida albicans*

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de micro-organisme

Bactéries

- Cocci à Gram positif

- *Staphylococcus aureus*

- **Staphylococcus à coagulase négatif**

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

...

- *Propionibacterium acnes*

- Streptocoques

- Entérocoques

- **Bacille à Gram négatif**

- Entérobactéries

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Levures

- *Candida albicans*

Antibiotic

Resistance

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de bactérie

Classification selon le mode de contamination de l'os

- Hématogène
- Après traumatisme ou chirurgie (inoculation)
- Après plaie chronique (escarre, pied diabétique)

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de bactérie

Classification selon le mode de contamination de l'os

- Hématogène
- Après traumatisme ou chirurgie (inoculation)
- Après plaie chronique (escarre, pied diabétique)

Classification selon la présence ou non d'un implant

- Prothèse
- Ostéosynthèse

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de bactérie

Classification selon le mode de contamination de l'os

- Hématogène
- Après traumatisme ou chirurgie (inoculation)
- Après plaie chronique (escarre, pied diabétique)

Classification selon la présence ou non d'un implant

- Prothèse
- Ostéosynthèse

Classification selon le délai de survenue

- Aigu
- Chronique

Biofilm bakterien

2,5 milliard
Cyanobacteries
formet du
biofilm

3,5 milliard
Premières
formes de vie

4,6 milliard
Développement
de la terre

Biofilm bactérien

2,5 milliard
Cyanobacteries
forment du
biofilm

3,5 milliard
Premières
formes de vie

4,6 milliard
Développement
de la terre

24h *in vitro* dans des conditions idéales

1 mois *in vivo* chez l'homme ???

Indissociable
de la surface
sous-jacente

Vie en communauté

Structure pluricellulaire

S. aureus

Staphylocoques
à coagulase
négatif

*Propionibacterium
acnes*

Electron micrograph of
S. epidermidis biofilm

Figure 1 – This diagram shows hematogenous osteomyelitis of a tubular bone in a child.

Infection aiguë
Réplication bactérienne intense
Infection suppurative
Congestion vasculaire

Infections chronique
Tissu osseux ischémique
Séquestre osseux
Ralentissement de la croissance bactérienne et persistance

MEDICAL PROGRESS

OSTEOMYELITIS: A REVIEW OF CLINICAL FEATURES, THERAPEUTIC CONSIDERATIONS AND UNUSUAL ASPECTS (First of Three Parts)*

FRANCIS A. WALDVOGEL, M.D., GERALD MEDOFF, M.D., AND MORTON N. SWARTZ, M.D.

X 2940

Biofilm et séquestre osseux
Evans et al. Clin Orthop 1998: 243-249

Variants microcolonies

Proctor RA, *Nat Rev Microbiol* 2006

Staphylococcus aureus Small Colony Variants in Prosthetic Joint Infection

Parham Sendi,¹ Markus Rohrbach,² Peter Graber,¹ Reno Frei,³ Peter E. Ochsner,² and Werner Zimmerli¹

¹Unit of Infectious Diseases, Basel University Medical Clinic Liestal and ²Clinic of Orthopedic Surgery, Kantonsspital, Liestal, and ³Microbiology Laboratory, University Hospital Basel, Basel, Switzerland

Sendi et al. *Clin Infect Dis.* 2006

Recovery of Small Colony Variants of *Staphylococcus aureus* Following Gentamicin Bead Placement for Osteomyelitis

Table 1. Small colony variants and normal colony type following previous local gentamicin treatment.

Case no.	Colony type	Previous local gentamicin therapy	Antibiotic	Site	Recurrence of osteomyelitis*
1	n	No			No
2	n	No			No
3	n	No			No
4	n	No			No
5	n	No			No
6	n	No			No
7	n	No			No
8	n	No			No
9	n	No			No
10	n	No	Amox/CA	Contiguous	No
11	SCV	Yes	Vm, Cfur	Postoperative	Yes
12	SCV, n	Yes	Cm	Postoperative	Yes
13	SCV, n	Yes	Vm	Posttraumatic	Yes
14	SCV, n	Yes	Oxa, Ctax, Cm	Postvaccination	Yes

NOTE. Amox/CA = amoxicillin/clavulanic acid; Cfur = cefuroxime; Cm = clindamycin; Cpx = ciprofloxacin; Ctax = cefotaxime; n = normal; Oxa = oxacillin; PenG = penicillin G; SCV = small colony variant; Vm = vancomycin.

* Relapse of osteomyelitis occurring more than 1 year after primary diagnosis and treatment.

Clinical Characteristics and Outcomes of Prosthetic Joint Infection Caused by Small Colony Variant Staphylococci

Aaron J. Tande,^{a,b} Douglas R. Osmon,^a Kerryl E. Greenwood-Quaintance,^b Tad M. Mabry,^c Arlen D. Hanssen,^c Robin Patel^{a,b,d}

Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine,^a Infectious Diseases Research Laboratory,^b Department of Orthopedic Surgery,^c and Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine and Pathology,^d Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

TABLE 1 Medical and orthopedic surgical history and PJI presentation^c

Characteristic ^d	SCV ^b		P value
	Yes (n = 38)	No (n = 75)	
Demographic factors			
Age in yr, median (range)	64 (25–85)	63 (36–84)	0.49
Female sex	16 (42.1)	31 (41.3)	1
Diabetes mellitus	10 (26.3)	20 (26.7)	0.97
Rheumatoid arthritis by ACR criteria	1 (2.6)	5 (6.7)	0.66
Orthopedic history			
Joint age in days, median (range)	1,295 (216–13,712)	646 (23–11,883)	0.007
Prior arthroplasty revision	32 (84.2)	52 (70.3)	0.17
Time since last surgery in days,	743 (31–10,030)	306 (20–8,686)	<0.0001
Orthopedic history			
Joint age in days, median (range)	1,295 (216–13,712)	646 (23–11,883)	0.007
Duration of PJI symptoms in days, median (range)			
	491 (14–2,306)	165 (2–1,656)	0.0003
Antibiotic loaded cement in place			
Aminoglycoside in cement ^a	7 (38.9)	8 (19.5)	0.19
PJI history			
Sinus tract	11 (28.9)	19 (25.3)	0.82
Receiving 120 or more days of antibiotics in prior 6 mo			
Receiving 120 or more days of antibiotics in prior 6 mo	16 (42.1)	17 (22.7)	0.048
Receiving 120 or more days of antibiotics in prior 6 mo			
Receiving 120 or more days of antibiotics in prior 6 mo	16 (42.1)	17 (22.7)	0.048

Clinical Characteristics and Outcomes of Prosthetic Joint Infection Caused by Small Colony Variant Staphylococci

Aaron J. Tande,^{a,b} Douglas R. Osmon,^a Kerryl E. Greenwood-Quaintance,^b Tad M. Mabry,^c Arlen D. Hanssen,^c Robin Patel^{a,b,d}

Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine,^a Infectious Diseases Research Laboratory,^b Department of Orthopedic Surgery,^c and Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine and Pathology,^d Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

	Yes (<i>n</i> = 38)
Demographic factors	
Age in yr, median (range)	64 (25–85)
Female sex	16 (42.1)
Diabetes mellitus	10 (26.3)
Rheumatoid arthritis by ACR criteria	1 (2.6)
Rheumatoid or inflammatory arthritis	3 (7.9)
CKD	2 (5.3)
Immunosuppressive therapy	4 (10.5)
Joint infected	
Knee	25 (65.8)
Hip	8 (21.1)
Shoulder	3 (7.9)
Elbow	2 (5.3)
Orthopedic history	
Joint age in days, median (range)	1,295 (216–13,71)
Prior arthroplasty revision	32 (84.2)
Time since last surgery in days, median (range)	743 (31–10,030)
Cemented arthroplasty	33 (86.8)
Antibiotic-loaded cement in place ^a	8 (44.4)
Aminoglycoside in cement ^a	7 (38.9)

Clinical Characteristics and Outcomes of Prosthetic Joint Infection Caused by Small Colony Variant Staphylococci

Aaron J. Tande,^{a,b} Douglas R. Osmon,^a Kerryl E. Greenwood-Quaintance,^b Tad M. Mabry,^c Arlen D. Hanssen,^c Robin Patel^{a,b,d}

Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine,^a Infectious Diseases Research Laboratory,^b Department of Orthopedic Surgery,^c and Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine and Pathology,^d Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

TABLE 1 Medical History	Yes (n = 38)	No (n = 75)	P value
Characteristic ^d			
Age in yr, median (range)	64 (25–85)	63 (36–84)	
Demographic factors	16 (42.1)	31 (41.3)	
Age in yr, median (range)	10 (26.3)	20 (26.7)	
Female sex	1 (2.6)	5 (6.7)	0.49
Diabetes mellitus	3 (7.9)	11 (14.7)	1
Rheumatoid arthritis	2 (5.3)	6 (8.0)	0.97
Rheumatoid arthritis on disease-modifying antirheumatic drug therapy	4 (10.5)	12 (16.0)	0.66
CKD			0.38
Immunosuppressive therapy	25 (65.8)	46 (61.3)	0.72
Joint infection	8 (21.1)	16 (21.3)	0.57
Knee	3 (7.9)	8 (10.7)	0.98
Hip	2 (5.3)	5 (6.7)	
Shoulder			
Elbow			
Orthopedic history	1,295 (216–13,712)	646 (23–11,883)	
Joint age in days at revision	32 (84.2)	52 (70.3)	0.007
Prior arthroplasty surgery in days, median (range)	743 (31–10,030)	306 (20–8,686)	0.17
Time since last surgery, median (range)	33 (86.8)	60 (80.0)	<0.0001
Cemented and cement in place ^e	8 (44.4)	16 (39.0)	0.44
Antibiotic-loaded cement	7 (38.9)	8 (19.5)	0.78
Aminoglycoside in cement ^a			0.19
PJI history			
Sinus tract			0.82
Duration of PJI symptoms, median (range)			0.0003
Prior surgery for this joint	66 (0–180)	13 (0–180)	0.37
Cumulative antibiotic days in prior surgery, median (range)			

Subjects infected with *S. aureus* were more likely to fail (HR, 4.03, 95%CI, 1.80-9.04)

Persisters in chronic BJI

“Bacterial cells that escape the effects of antibiotics without undergoing genetic change”

Courtesy
J. Josse

Persisters in chronic BJI

“Bacterial cells that escape the effects of antibiotics without undergoing genetic change”

Intracellular survival

S. aureus

Osteoblast

Osteocyte

Osteoclast

Biofilm formation

Implant

Courtesy
J. Josse

Hétérogénéité des IOA

Classification selon la localisation anatomique

Classification selon le type de bactérie

Classification selon le mode de contamination de l'os

- Hématogène
- Après traumatisme ou chirurgie (inoculation)
- Après plaie chronique (escarre, pied diabétique)

Classification selon la présence ou non d'un implant

- Prothèse
- Ostéostéosynthèse

Classification selon le délai de survenue

- Aigu
- Chronique

Classification selon le caractère simple ou complexe

Caractère simple ou complexe

IOA Simples

Spondylodiscite
Origine hématogène
Pas d'abcédation
Guérison avec
antibiotiques seuls

Caractère simple ou complexe

IOA Simples

Ostéomyélite de l'enfant
Origine hématogène
Le plus souvent sans complications

Kingella kingae

S. aureus

Guérison avec
antibiotiques seuls

Caractère simple ou complexe

IOA Simples

IOA Simples mais
pouvant devenir
complexes

Infection post-opératoire
aiguë de prothèse
Chirurgie (lavage) et
antibiotiques

Caractère simple ou complexe

IOA Simples

IOA Simples mais
pouvant devenir
complexes

IOA complexes

Caractéristiques

45 ans
Fracture
ostéosynthèse

le ou complexe

Matériel cassé
Foyer de fracture infecté
Pseudarthrose septique
Effraction cutanée

Infection du matériel
Biofilm et séquestres
Instabilité
Couverture cutanée

IOA complexes

**Risque
d'amputation**

Pediatric Bone and Joint Infections Caused by Panton-Valentine Leukocidin-Positive *Staphylococcus aureus*

Bruno Dohin, MD, PhD, Yves Gillet, MD,† Rémi Kohler, MD,* Gérard Lina, MD, PhD,‡
François Vandenesch, MD, PhD,‡ Philippe Vanhems, MD, PhD,§ Daniel Floret, MD,†
and Jerome Etienne, MD, PhD‡*

Leucocidine de Panton-Valentine (PVL)

- Sujet jeune
- Infection communautaire hémotogène
- Parfois associé à une pneumonie nécrosante
- Atteinte osseuse et musculaire étendue ++

**Au milieu de cette très grande
hétérogénéité...**

Qui fait quoi ???

**Quelle prise en
charge ???**

PARIS
MATCH

GUILLAUME DEPARDIEU

Mon amputation m'a sauvé

SA GRANDE
INTERVIEW VERITE

"Après la mort
de mon amie
Marie Trintignant,
je me suis dit:
**Je vais vivre,
il le faut**"

Photographie par Richard
Merkouf. Guillaume est un homme
serein. L'amputation d'une jambe,
le 6 juin dernier, l'a arraché
à ses démons.

BAGDAD
De la guérilla au terrorisme

MICHEL SARDOU
"Je suis fou de ma femme"
Ils reçoivent Match
dans leur maison en Corse

www.parismatch.com
M 00553-2011-P-220 €

Hospices Civils de Lyon

Réseau des CRIOAc

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

1. MIG : total national stable à 1,4 M€

CRIOA	ETP	
Coordonnateur (x9)	1 TEC + 1 secrétariat	108k€
Correspondant (x21)	0,3 TEC	17,9k€

T. Ferry OTSR 2018

Mandat 2017-2022

● CRIOAc coordonnateur

● Centres correspondants

● Centres correspondants nouvellement labélisé

Les missions, l'expérience et les pratiques sont variables

Figure 2. Représentation schématisique du niveau d'expertise théorique des structures hospitalières en France dans le domaine des IOA.

Missions des CRIOAc

Selon l'instruction DGOS/PF2 n° 2010-466

- Répondre aux demandes d'avis
- Prendre en charge des IOA simples comme complexes.
- Organiser des RCP
- Améliorer la filière de soin Centres correspondants
- **Evaluer les pratiques, participer à la rédaction des recommandations de bonnes pratiques**
- **Promouvoir la recherche clinique, mais aussi si possible la recherche translationnelle**
- **Enseigner à l'échelle de la région et nationale, en participant directement à l'organisation du Diplôme Interuniversitaire IOA mis en place en 2014**

CRIOAc

https://si-ioa.sante.gouv.fr

Sud-Est - CR - Hospices civils de Lyon - RCP Chirurgie Septique

MO [] E, 72 ans

Contexte de la RCP Synthèse clinique Localisation/Microbiologie/Chirurgie **Antibiothérapie** Finalisation et validation de la RCP

Episode : Premier épisode Rechute

Motif : Stratégie médico-chirurgicale
 Bilan pré-thérapeutique
 Réévaluation en cours de traitement
 Deuxième temps de chirurgie après infection

Passage en recours/deuxième avis : Oui Non

Précédentes fiches RCP

	Intitulé RCP		
☒	HCL		
☒	HCL		
☒	HCL	16/01/2014
☒	HCL	05/12/2013

Page 1 sur 1 Page courante 1 - 5 sur 5

Age : 72 Poids actuel : 89 kg Taille : 175 cm IMC : 29.06

Dosage CRP : 25 mg/L

Score ASA : 3 - Patient avec anomalie systémique sévère

Créatininémie : 120 $\mu\text{mol/L}$ Clairance de la créatinine : 52,5 mL/min/1,73m²

Comorbidités ou terrains interférents :

- Insuffisance rénale Insuffisance hépatique Insuffisance cardiaque
 Polypathologie Immunodépression Diabète

Justification :

Facteurs de risque :

- Traitement immunosupresseur Infection par le virus VIH ou par les virus des hépatites
 Cirrhose Néoplasie évolutive
 Chimiothérapie anti-cancéreuse Maladies auto-immunes et rhumatismes inflammatoires chroniques
 Rhumatisme inflammatoire chronique Drépanocytose
 Hémophile Transplantation d'organe
 Obésité morbide (IMC > 30) Tabagisme actif
 Diabète avec complication(s) Autre :

Si Autre, préciser :

Allergie connue aux antibiotiques :

Résumé clinique :

Patiente vue à 3 semaines de l'implantation de la prothèse arthrode. Antibiothérapie probabiliste par TAZOCILLINE et LINEZOLIDE. Patiente sous TRIFLUCAN au moins jusqu'à l'automne 2014. Cultures positives à Staphylocoque épidermidis multi résistant (2 prélèvements positifs uniquement en milieu liquide). Localement bonne cicatrisation.

Microbiologie

Ajouter

Site

Genou

Prise en charge

Actualiser

Site

Genou

'Document site' créé le 09/12/2013 à 11:04 par Tristan FERRY

Site : Côté : Gauche Droit

Cadre nosologique :

☒ Prothèse	☐ Ostéite
☐ Pseudarthrose	☐ Arthrite
☐ Matériel d'ostéosynthèse	☐ Autres

Microbiologie

Microbiologie : Documenté fiable Non documenté Non contributif

Germe(s)

Avec résistance

Commentaire :

PEC Chirurgicale

Acte :

Remarques :

- Ablation de matériel
- Abstention chirurgicale contre indication
- Abstention chirurgicale non-indication
- Abstention chirurgicale refus du patient
- Amputation
- Arthrodèse
- Biopsie
- Changement prothèse 1 temps
- Changement prothèse 2 temps
- Changement prothèse partiel
- Espaceur

M0 72 ans

Contexte de la RCP

Synthèse clinique

Localisation/Microbiologie/Chirurgie

Antibiothérapie

Finalisation et validation de la RCP

Antibiothérapie

Abord veineux :

Périphérique Cathéter central

Chambre implantable Picc Line

Absence d'abord veineux

Prescription antibiothérapie pré-opératoire

Non Oui

Prescription antibiothérapie post-opératoire

Non Oui

Molécule

Posologie

Durée prévisible

Voie d'administration

Daptomycine

850mg 1j sur 2

3 mois

 iv po sc

+

Tigécycline

50mg/12h

3 mois

 iv po sc

+

-

Péfloxacine

Pénicillines G

Pénicillines V

Pipéracilline

Pipéracilline tazobactam

Pristinamycine

Quinolone autre

Quinupristine +dalfopristine

Rifampicine

Sulfadiazine

Sulfaméthoxazole Triméthoprim

Teicoplanine

Ticarilline

Ticarilline ac clavulanique

Tigécycline

MOR 72 ans

Contexte de la RCP Synthèse clinique Localisation/Microbiologie/Chirurgie Antibiothérapie **Finalisation et validation de la RCP**

IOA complexe : Non Oui Critères de complexité

Critères : Echec de traitement antérieur Programme chirurgical
 Terrain Microbiologie

Etablissement de prise en charge : Liste des établissements

Criteria of complexity

- **Patient :**

- Patients avec de sévères comorbidités limitant le programme thérapeutique
- Patients avec une(des) allergie(s)

- **Micro-organisme :**

- Micro-organisme difficile à traiter

- **Chirurgie :**

- IOA nécessitant un traitement chirurgical (une reconstruction osseuse et/ou des tissus mous (au de couverture))

- **Rechute**

Valorisation du séjour chirurgical
+12%

The CRIOAc healthcare network in France: A nationwide Health Ministry program to improve the management of bone and joint infection

Nombre de dossiers discutés en réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) au CRIOAc de Lyon

Aujourd'hui ◀ ▶ **février 2020** ▼

[Imprimer](#)
[Semaine](#)
[Mois](#)
[Planning](#) ▼

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27 VisioRCP Centres Hospit	28	29	30 RCP HDJ	31	1 févr.	2
3 VisioRCP Centres Hospit	4	5 VisioRCP CHLS	6 RCP HDJ	7	8	9
10	11	12	13 RCP HDJ	14	15	16
17 VisioRCP Centres Hospit	18	19 VisioRCP CHLS	20 RCP HDJ	21	22	23
24 VisioRCP Centres Hospit	25	26	27 RCP HDJ	28	29	1 mars

Place of residence of patients managed in CRIOAc Lyon

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

≈ 8 million inhabitants

Area of recruitment
close to that of
Switzerland

≈ 500 patients/year

Comité scientifique des CRIOAc

Président : Pr. T. Ferry (Infectiologue, Lyon)
Pr. E. Senneville (Infectiologue, Lille-Tourcoing)
Pr. A. Stein (Infectiologue, Marseille)

Dr. S. Marmor (Orthopédiste, Paris)
Pr. E. Steindel (Orthopédiste, Brest)
Pr. D. Meynard (Orthopédiste, Strasbourg)

Dr. P. Bemer (Microbiologiste, Nantes)
Pr. V. Dubois (Microbiologiste, Bordeaux)

Centraliser les idées pour la réalisation de projets de recherche à l'échelle nationale

Expertise pluridisciplinaire

Utilisation du système d'information pour les études de faisabilité

**DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L'OFFRE
DE SOINS**

Promotion de la
recherche et de
l'innovation

Mme X., 72 ans sans antécédents, a une coxarthrose invalidante, prédominante à gauche.

Mme X., 72 ans sans antécédents, a une coxarthrose invalidante, prédominante à gauche. Une PTH gauche est donc posée sans difficulté ni complications post-opératoires immédiates.

Mme X., 72 ans sans antécédents, a une coxarthrose invalidante, prédominante à gauche. Une PTH gauche est donc posée sans difficulté ni complications post-opératoires immédiates. Il existe à J+13 une cicatrice douloureuse avec une fièvre à 38° .

**Tuméfaction
Collection
Inflammation**

Arthrotomie-Synovectomie-Lavage
Pus au contact de la prothèse
**Antibiothérapie post-opératoire
probabiliste large spectre
puis adaptée au germe retrouvé**

Ecoulement

Recommandation de bonne pratique

Prothèse de hanche ou de genou :
diagnostic et prise en charge de l'infection
dans le mois suivant l'implantation

Pr. Tristan Ferry

Chargé de projet (argumentaire médical)

Service de Maladies Infectieuses

Hospices Civils de Lyon

Centre inter-régional de Référence IOAc Rhône-Alpes Auvergne

Chargé de projet (argumentaire chirurgical) : Dr. Thomas Bauer

Président du groupe de travail : Dr. Jean Marc Ziza

Groupe de travail

Groupe de lecture

Modalités de prise en charge thérapeutique des patients

Antibiothérapie probabiliste

Vancomycine

+

C3G IV

ou

Pipéracilline tazobactam

Staphylocoques S et R à la méticilline
Streptocoques
Enterocoques

Entérobactéries communautaires
P. Aeruginosa & Anaérobies (Pip.-Taz.)

Modalités de prise en charge thérapeutique des patients

Antibiothérapie probabiliste

Vancomycine + **C3G IV**
ou
Pipéracilline tazobactam

En post-opératoire immédiat
A adapter à l'épidémiologie locale
A réadapter avec les résultats des cultures

Risk of Acute Kidney Injury in Patients on Concomitant Vancomycin and Piperacillin–Tazobactam Compared to Those on Vancomycin and Cefepime

Bhagyashri Navalkele,^{1,2} Jason M. Pogue,^{2,7} Shigehiko Karino,^{1,2} Bakht Nishan,² Madiha Salim,² Shantanu Solanki,² Amina Pervaiz,² Nader Tashtoush,² Hamadullah Shaikh,² Sunitha Koppula,² Jonathan Koons,² Tanveer Hussain,² William Perry,² Richard Evans,³ Emily T. Martin,³ Ryan P. Mynatt,⁴ Kyle P. Murray,⁵ Michael J. Rybak,^{2,4,6} and Keith S. Kaye^{1,2}

Risk of Acute Kidney Injury in Patients on Concomitant Vancomycin and Piperacillin–Tazobactam Compared to Those on Vancomycin and Cefepime

Bhagyashri Navalkele,^{1,2} Jason M. Pogue,^{2,7} Shigehiko Karino,^{1,2} Bakht Nishan,² Madiha Salim,² Shantanu Solanki,² Amina Pervaiz,² Nader Tashtoush,² Hamadullah Shaikh,² Sunitha Koppula,² Jonathan Koons,² Tanveer Hussain,² William Perry,² Richard Evans,³ Emily T. Martin,³ Ryan P. Mynatt,⁴ Kyle P. Murray,⁵ Michael J. Rybak,^{2,4,6} and Keith S. Kaye^{1,2}

hazard ratio = 4.27; 95% confidence interval, 2.73–6.68

Délai de survenue et épidémiologie bactérienne des infections sur prothèse articulaire : impact sur le choix de l'antibiothérapie probabiliste

Depuis janvier 2017
Vancomycine + Céfépime

Infections post-opératoires aiguës de prothèse (<1 mois)

Mme X., 72 ans sans antécédents, a une coxarthrose invalidante, prédominante à gauche. Une PTH gauche est donc posée sans difficulté ni complications post-opératoires immédiates. Il existe à J+13 une cicatrice douloureuse avec une fièvre à 38° .

Recommandation de bonne pratique

Prothèse de hanche ou de genou : diagnostic et prise en charge de l'infection dans le mois suivant l'implantation

Grade des recommandations	
A	Preuve scientifique établie Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d'essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées.
B	Présomption scientifique Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte.
C	Faible niveau de preuve Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4).
AE	Accord d'experts En l'absence d'études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L'absence de gradation ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des études complémentaires.

Prothèse de hanche ou de genou diagnostic et prise en charge de l'infection dans le mois suivant l'implantation

Mars 2017

Messages clés

Prothèse de hanche ou de genou diagnostic et prise en charge de l'infection dans le mois suivant l'implantation

Mars 2017

**Tuméfaction
Collection
Inflammation**

Ecoulement

Prothèse de hanche ou de genou diagnostic et prise en charge de l'infection dans le mois suivant l'implantation

Mars 2017

Messages clés

Préambule

Contexte d'élaboration

Objectif

Avertissement

Facteurs de risque associés aux infections

Repérage et diagnostic de l'infection sur prothèse dans le mois suivants l'implantation

Algorithme

Repérage d'une infection précoce

Quels sont les signes cliniques en faveur de l'infection

Messages clés

Préambule

Contexte d'élaboration

Objectif

Avertissement

Facteurs de risque associés aux infections

Modalités de prise en charge thérapeutique des patients

Messages clés

Préambule

Contexte d'élaboration

Objectif

Avertissement

Facteurs de risque associés aux infections

Prévalence et diagnostic de l'infection sur prothèse dans le mois suivants l'implantation

Algorithme

Modalités de prise en charge thérapeutique des patients

Arthrotomie-synovectomie-lavage et changement des pièces mobiles

Messages clés

Préambule

Contexte d'é

nérale et diagnos

laorithme

Courtesy S. Lustig

Réduction mécanique de la quantité de bactérie (inoculum)

Infection de prothèse Classification

Infection aiguë

1 mois

Infection chronique

Traitement
conservateur

Ablation de
l'implant

Reprise chirurgicale

Arthrotomie-synovectomie-lavage

Réduction de l'inoculum bactérien

Diagnostic microbiologique

Antibiothérapie adaptée

Traitement de l'infection aiguë

Taux de succès

≈ 80%

Modalités de prise en charge thérapeutique des patients

AUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Prothèse de hanche ou de genou :
diagnostic et prise en charge de l'infection
dans le mois suivant l'implantation

Mars 2014

Messages clés

Préambule

Contexte d'élaboration

Objectif

Avertissement

Facteurs de risque associés aux infections

Modalités de prise en charge thérapeutique des patients

diagnostic et prise en charge de l'infection
dans le mois suivant l'implantation

Mars 2014

Messages clés

Préambule

Contexte d'élaboration

Objectif

Avertissement

diagnostic et prise en charge de l'infection
dans le mois suivant l'implantation

Mars 2014

Messages clés

Outcome and Predictors of Treatment Failure in Total Hip/Knee Prosthetic Joint Infections Due to *Staphylococcus aureus*

Eric Senneville, Donatienne Joulie, Laurence Legout, Michel Valette, Hervé Dezèque, Eric Beltrand, Bernadette Roselé, Thibaud d'Escrivan, Caroline Loïez, Michèle Caillaux, Yazdan Yazdanpanah, Carlos Maynou, and Henri Migaud

Centre National de Référence des Infections Ostéo-Articulaires Nord-Ouest, Roger Salengro Faculty Hospital of Lille, Lille, France

Facteurs protecteurs en univarié

- ASA score ≤ 2
- prescription of adequate empirical postsurgical antibiotic therapy
- use of rifampin combination therapy

In multivariate analysis

- ASA score ≤ 2
- rifampin-fluoroquinolone combination therapy

Figure 1. Kaplan–Meier estimates of the cumulative risk of failure according to the treatment group assessed at 24 months follow-up. Patients in the rifampin-fluoroquinolone treatment group had a lower risk of experiencing treatment failure than did patients treated with other antibiotic regimens ($P = .003$). *Dotted line*, rifampin-fluoroquinolone treatment group ($n = 39$); *solid line*, other regimens group ($n = 59$).

Nieves Jaén¹
 Juan C. Martínez-Pastor²
 Ernesto Muñoz-Mahamud²
 Sebastián García-Ramiro²
 Jordi Bosch³
 Josep Mensa¹
 Alex Soriano¹

Long-term outcome of acute prosthetic joint infections due to gram-negative bacilli treated with retention of prosthesis

¹Department of Infectious Diseases of Hospital Clinic of Barcelona.

²Department of Orthopaedics of Hospital Clinic of Barcelona.

³Laboratory of Microbiology of Hospital Clinic of Barcelona. Hospital Clinic Universitari. IDIBAPS. Barcelona.

Table 2 Outcome according to the value of C-reactive protein and the antimicrobial therapy received.

Value of CRP	Failure, n=17 (%)	Remission, n=30 (%)	P ^a
≤ 15 mg/dl			
- no fluoroquinolone			
or resistant strain (n=13)	7 (63.6)	6 (25)	0.028
- fluoroquinolone (n=22)	4 (36.4)	18 (75)	
> 15 mg/dl			
- no fluoroquinolone			
or resistant strain (n=11)	5 (83.3)	1 (16.7)	0.021
- fluoroquinolone (n=12)	1 (16.7)	5 (83.3)

2014

Recommandation de bonne

Prothèse de hanche ou de
diagnostic et prise en charge de l'
dans le mois suivant l'imp

Recommandation de bonne pratique

Prothèse de hanche ou de genou :
diagnostic et prise en charge de l'infection
dans le mois suivant l'implantation

Messages clés

ule

te d'élaboration

Objectif

Avertissement

2013

2017

Facteurs de risque associés aux infections

« **DAIR** »

Debridement and implant retention

gnostic de l'infection sur prothèse dans le mois suivants l'implantation

infection précoce

Quels sont les signes cliniques en faveur de l'i

Mr C. 75 ans a une PTG gauche depuis 8 ans, jusque la non douloureuse. Il présente une prostatite à *E. coli* avec fièvre et hémocultures positives. Il est très douloureux au niveau de son genou gauche.

Infection aiguë de prothèse par voie hématogène

Arthrotomie-Synovectomie-Lavage

Arthrite sur PTG

- Douleurs
- Epanchement aigu
- Inflammation
- Impotence fonctionnelle

Pas de
descellement

Infection post-opératoire de prothèse

Classification

Infection aiguë

Infection chronique

1 mois

Traitement conservateur

Ablation de l'implant

Reprise chirurgicale
Arthrotomie-synovectomie-lavage
Réduction de l'inoculum bactérien
Diagnostic microbiologique
Antibiothérapie adaptée

Reprise chirurgicale
Excision des tissus infectés
Changement en 1 ou 2 temps
Réduction de l'inoculum
Diagnostic microbiologique
Antibiothérapie adaptée

Changement de prothèse infection chronique

Mr B., 63 ans, vient vous voir à 5 mois de la pose d'une prothèse totale de genou (PTG) droite.

T. Ferry

Mr B., 63 ans, vient vous voir à 5 mois de la pose d'une prothèse totale de genou (PTG) droite.

TRAITEMENT

Explantation

S. epidermidis
multirésistant

7 pv / 7

Antibiothérapie

Prolongée par

vancomycine

et rifampicine

Prothèse posée il y a 6 ans. Absence de douleurs

Fistule

Descellement de prothèse

Radiographie post-opératoire de la pose de la PTH

Radiographie de la PTH 3 ans ½ après sa pose

**Douleurs mécaniques
sans fistule ni fièvre**

**Descellement
mécanique ou
septique ?**

Changement en 1 ou 2 temps

1

Descellement (radiologique)

Infection chronique à
Propionibacterium acnes

T. Ferry

Mai 2009

Recommandations de pratique clinique

Infections ostéo-articulaires sur matériel

(prothèse, implant, ostéo-synthèse)

Quels prélèvements ?

Prélèvements préopératoires : **NON** (en dehors du liquide articulaire par ponction)

Prélèvements peropératoires : **OUI +++**

- en théorie en dehors de toute antibiothérapie
(fenêtre de 15 jours pour les infections chroniques +++)
- au moins 5 (zones macroscopiquement pathologiques)
- liquide ou solide (pus, liq articulaire, os)
- pas à l'écouvillon, en changeant d'instrument
- acheminement rapide

Prolonged Bacterial Culture to Identify Late Periprosthetic Joint Infection: A Promising Strategy

Peter Schäfer,¹ Bernd Fink,² Dieter Sandow,¹ Andreas Margull,¹ Irina Berger,³ and Lars Frommelt⁴

¹Ambulatory Healthcare Center, Labor Ludwigsburg, Ludwigsburg, ²Clinic of Joint Replacement, General and Rheumatic Orthopaedics, Orthopaedic Clinic Markgröningen, Markgröningen, ³Institute of Pathology, Klinikum Kassel, Kassel, and ⁴ENDO-Klinik, Hamburg, Germany

Clin Infect Dis. 2008, 47(11):1403-9.

Figure 1. Time to diagnosis of infection by culture. Whisker lines span the 95% Hall-Wellner CI.

Infection ou contamination ?

2.5.1 Infection certaine

- Présence d'une fistule au contact de la prothèse ou de l'implant (**niveau 3**) ;
- Présence de pus dans l'articulation ou au contact de la prothèse ou de l'implant (**avis d'expert**) ;
- Présence d'au moins 3 prélèvements (3 prélèvements per opératoires ou 2 prélèvements per opératoires + 1 prélèvement par ponction articulaire réalisée quelques jours avant la chirurgie) ou 2 prélèvements espacés dans le temps (1 prélèvement per opératoire + 1 prélèvement par ponction articulaire) positifs à la même bactérie (même espèce avec même antibiogramme) appartenant à la flore cutanée (ex : staphylocoque à coagulase négative, *Propionibacterium acnes*, corynébactérie...) et dont l'isolement pose la question d'une éventuelle contamination (**niveau 2**) ;
- Présence d'au moins 1 prélèvement positif (1 prélèvement par ponction articulaire ou 1 prélèvement per opératoire ou par hémoculture) à une bactérie n'appartenant pas à la flore cutanée et pour lequel la question d'une contamination ne se pose pas (ex : *Staphylococcus aureus*, entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*...) ou avec une bactérie exceptionnellement rencontrée pour laquelle la question d'une contamination ne se pose pas (ex : *Streptococcus pneumoniae*, *Salmonella*, *Listeria*, *Campylobacter*, *Pasteurella*...) (**avis d'expert**).

Infection ou contamination ?

2.5.1 Infection certaine

- Présence d'une fistule au contact de la prothèse ou de l'implant (**niveau 3**) ;
- Présence de pus dans l'articulation ou au contact de la prothèse ou de l'implant (**avis d'expert**) ;
- Présence d'au moins 3 prélèvements (3 prélèvements per opératoires ou 2 prélèvements per opératoires + 1 prélèvement par ponction articulaire réalisée quelques jours avant la chirurgie) ou 2 prélèvements espacés dans le temps (1 prélèvement per opératoire + 1 prélèvement par ponction articulaire) positifs à la même bactérie (même espèce avec même antibiogramme) appartenant à la flore cutanée (ex : staphylocoque à coagulase négative, *Propionibacterium acnes*, corynébactérie...) et dont l'isolement pose la question d'une éventuelle contamination (**niveau 2**) ;
- Présence d'au moins 1 prélèvement positif (1 prélèvement par ponction articulaire ou 1 prélèvement per opératoire ou par hémoculture) à une bactérie n'appartenant pas à la flore cutanée et pour lequel la question d'une contamination ne se pose pas (ex : *Staphylococcus aureus*, entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*...) ou avec une bactérie exceptionnellement rencontrée pour laquelle la question d'une contamination ne se pose pas (ex: *Streptococcus pneumoniae*, *Salmonella*, *Listeria*, *Campylobacter*, *Pasteurella*...) (**avis d'expert**).

Changement en 2 temps

Implication des Staphylocoques à coagulase négatifs multirésistants

Taux de succès
≈ 90%

Mais traitement contraignant +++

Menace pour le membre (amputation) si échecs multiples

Ciments aux antibiotiques et prothèse

Ciments aux antibiotiques et prothèse

Spacer transitoire en ciment
dans le cadre d'un
changement en 2 temps

- Gentamicine
- ajout de vancomycine (2g)

Ciments aux antibiotiques et prothèse

Spacer transitoire en ciment
dans le cadre d'un
changement en 2 temps

- Gentamicine
- « ajout manuel » de Vanco

Ciment utilisé lors de la réimplantation (fixation)
(ciments commerciaux)

- Gentamicine
- G + V
- G + C

Prothèse arthrodièse

© Copyright F. Laurent, S. Lustig, T. Ferry

Mr. V, 57 ans, AVP en 1992, pseudarthrose « aseptique »
traitée par clou puis par ostéosynthèse et greffe

Chirurgie n° 1 :
Ablation du matériel,
Résection osseuse
1^{er} temps de masquetelet
Staphylocoques sensibles

Mr. V, 57 ans, AVP en 1992, pseudarthrose « aseptique »
traitée par clou puis par ostéosynthèse et greffe

Chirurgie n° 1 :
Ablation du matériel,
Résection osseuse
1^{er} temps de masquetelet
Staphylocoques sensibles

Chirurgie n° 2 :
Ostéosynthèse
Greffe
S+6 (stérile)

M+3

Mr D., 63 ans, fracture ouverte consolidée il y a 20 ans. Fistule actuellement.

DIAGNOSTIC

Ostéite chronique

TRAITEMENT

1 TEMPS

Traitement de l'infection
Reprise chirurgicale
Ostéotomie (fenêtre)
Curetage
Ablation des séquestres
S. aureus 5 pv / 5
Antibiothérapie
prolongée

Mr D., 63 ans, fracture ouverte consolidée il y a 20 ans. Fistule actuellement.

DIAGNOSTIC

Ostéite chronique

TRAITEMENT

1 TEMPS

Traitement de l'infection
Reprise chirurgicale
Ostéotomie (fenêtre)
Curetage
Ablation des séquestres
S. aureus 5 pv / 5
Antibiothérapie
prolongée

The American
Journal of Surgery

Mr D., 63 ans, fracture ouverte consolidée il y a 20 ans. Fistule actuellement.

DIAGNOSTIC

Ostéite chronique

TRAITEMENT

1 TEMPS

Traitement de l'infection
Reprise chirurgicale
Ostéotomie (fenêtre)
Curetage
Ablation des séquestres
S. aureus 5 pv / 5
Antibiothérapie
prolongée

Lambeau de couverture

Curetage osseux → VAC therapy → Lambeau

VAC therapy (vacuum-assisted closure)

Thérapie à pression négative

Lambeau de couverture

Dr. F. Boucher
Dr. J. Château
Dr. H. Shipkov
Dr. M. Ismail
Pr. A. Mojallal

Hospices Civils de Lyon

Lambeau de couverture

Dr. F. Boucher
Dr. J. Château
Dr. H. Shipkov
Dr. M. Ismail
Pr. A. Mojallal

Hospices Civils de Lyon

Mr F., 45 ans, diabétique de type 1, présente une lésion indolore du pied gauche.

MAL PERFORANT PLANTAIRE

Physiopathologie

- Trois phénomènes liés directement au diabète rendent compte du tableau :
- **Neuropathie diabétique**
- **Atteinte vasculaire**
- **Immunodépression**

Ostéite du pied diabétique

- **Imagerie**

Radiographie standard

IRM

Ostéite du pied diabétique

- **Imagerie**

Radiographie standard

IRM

- **Complications**

Extension de l'infection avec risque d'amputation

8 *Amputation transmétatarsienne.
A. Tracé des incisions, vue dorsolatérale.
B. Amputation réalisée, vue de la voûte plantaire.
C. Fermeture cutanée.*

Ostéite du pied diabétique

- **Imagerie**

Radiographie standard

IRM

- **Complications**

Extension de l'infection avec risque d'amputation

Prise en charge médico-chirurgicale des principales IOA

- Certaines IOA **NE peuvent PAS** guérir sans recourir à la chirurgie :
 - IOA sur matériel (quelque soit le caractère aigu ou chronique)
 - Ostéomyélite/ostéite chronique de l'adulte
- Certaines IOA peuvent guérir sans recourir à la chirurgie :
 - IOA hématogènes « non compliquées »
 - Arthrite aiguë hématogène des petites articulations
 - Ostéomyélite non compliquée de l'enfant
 - Spondylodiscite infectieuse aiguë non compliquée
 - Infection non compliquée du pied diabétique
- La chirurgie se discute :
 - IOA hématogènes « compliquées »
 - Arthrite aiguë des grosses articulations
 - Ostéomyélite compliqué de l'enfant
 - Infection compliqué du pied diabétique

Antibiotiques et IOA

- **Pénétration des antibiotiques dans le tissu osseux**

- **Excellente :**

- Fluoroquinolone systémique
 - Macrolides et Lincosamides
 - Rifampicine (activité anti-biofilm)
 - Acide fusidique
 - Fosfomycine
 - Cyclines

- **Moyenne :**

- Bétalactamines
 - Glycopeptides (teicoplanine > vancomycine)
 - Cotrimoxazole

- **Faible :**

- Aminosides

Antimicrobial Activity against Intraosteoblastic *Staphylococcus aureus*

Florent Valour,^{a,b} Sophie Trouillet-Assant,^b Natacha Riffard,^b Jason Tasse,^b Sacha Flammier,^b Jean-Philippe Rasigade,^{b,c} Christian Chidiac,^{a,b} François Vandenesch,^{b,c,d} Tristan Ferry,^{a,b} Frédéric Laurent,^{b,c,d} on behalf of the Lyon Bone and Joint Infection Study Group

Infectious Diseases Department, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France^a; INSERM U1111, International Centre for Research in Infectiology, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France^b; Laboratory of Bacteriology, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France^c; French National Reference Center for Staphylococci, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France^d

2015

INVASION (2h)

Lysostaphine
200 µg/mL

ATB à tester – 24h

- . Cos
- . Cmin = Cos/3
- . Cmax = Cos x 3

Lyse cellulaire
(choc osmotique)

Numération des
bactéries
internalisées par
étalement des
lysats

Action intracellulaire à concentration osseuse

Valour et al. BJI Study Group. *Antimicrob Agents Chemother* 2015

Action intracellulaire à concentration osseuse

Valour et al. BJI Study Group. *Antimicrob Agents Chemother* 2015

Action intracellulaire à concentration osseuse

Valour et al. BJI Study Group. *Antimicrob Agents Chemother* 2015

Action intracellulaire à concentration osseuse

Valour et al. BJI Study Group. *Antimicrob Agents Chemother* 2015

Antibiotiques et IOA

- **Pénétration des antibiotiques dans le tissu osseux**

- **Excellente :**

- Fluoroquinolone systémique
 - Macrolides et Lincosamides
 - }] Pas en monothérapie sur *S. aureus*
 - Rifampicine (activité anti-biofilm) jamais en monothérapie
 - Acide fusidique jamais en monothérapie
 - Fosfomycine jamais en monothérapie
 - Cyclines

- **Moyenne :**

- Bétalactamines à utiliser à forte dose ; voie IV
 - Glycopeptides (teicoplanine > vancomycine) ; voie IV
 - Cotrimoxazole

- **Faible :**

- Aminosides

Exemples pour *S. aureus*

- Sensible à la méticilline : Pénicilline M forte doses IV
puis fluoroquinolone + rifampicine
 - Résistant à la méticilline : Glycopeptides + 1 antibiotique per os
puis 2 antibiotiques per os

Innovation et infection ostéoarticulaire

- Optimisation de l'antibiothérapie hors AMM (et nouveaux antibiotiques)
- Bactériophages et lysines de bactériophages
- Nouveaux implants (prothèse-arthrodèse en argent)
- Nouveaux substituts osseux (antibiotiques)

**HORS
AMM**

**HORS
AMM**

Prescription « hors AMM »

- S'assurer de l'absence d'alternatives
- Connaître les éléments de la littérature permettant de justifier chaque choix
 - Molécule
 - Voie d'administration
 - Dose
 - Interactions médicamenteuses
- Informer le patient
- Exposition à des effets indésirables attendus et non attendus

**HORS
AMM**

**HORS
AMM**

Daptomycine et os

Données PK

- Forte liaison protéique (90%)
- Seule la forme libre pénètre dans l'intertitium du tissu osseux
- Faible pénétration ratio os/sérum 0.1

Landersdorfer *Clin Pharmacokinet* 2009

13 volontaires sains

	C _{max} plasmatique	Concentration osseuse	Concentration synoviale
Médiane [extrêmes], mg/l	71,3 [39,4-110,3]	3,1 [1,4-5,7]	22,4 [13,1-35,0]

8 mg/kg
1 injection

H+7

Ratio
0.04

Chirouze et al. *ICAAC* 2011 A1-1745

Soft tissue and bone penetration abilities of daptomycin in diabetic patients with bacterial foot infections

Friederike Traummüller^{1,2†}, Michael V. Schintler^{1†}, Julia Metzler¹, Stephan Spendel¹, Oliver Mauric², Martin Popovic^{2,3}, Karl Heinz Konz⁴, Erwin Scharnagl¹ and Christian Joukhadar^{1,2,5,6*}

J Antimicrob Chemother 2010

6 mg/kg
Au plateau

Hors AMM

Daptomycin > 6 mg/kg/day as salvage therapy in patients with complex bone and joint infection: cohort study in a regional reference center

Sandrine Roux^{1,2}, Florent Valour^{1,2,3}, Judith Karsenty^{1,2,4}, Marie-Claude Gagnieu⁵, Thomas Perpoint¹, Sébastien Lustig^{2,6}, Florence Ader^{1,2,3}, Benoit Martha⁴, Frédéric Laurent^{2,3,7}, Christian Chidiac^{1,2,3}, Tristan Ferry^{1,2,3*} and on behalf of the Lyon BJl Study group

Pharmacokinetic Variability of Daptomycin during Prolonged Therapy for Bone and Joint Infections

Sylvain Goutelle,^{a,b,c} Sandrine Roux,^d Marie-Claude Gagnieu,^g Florent Valour,^d Sébastien Lustig,^e Florence Ader,^{d,e,f} Frédéric Laurent,^{b,e,f} Christian Chidiac,^{d,e,f} Tristan Ferry,^{d,e,f} on behalf of the Lyon Bone and Joint Infections Study Group

FIG 2 Plot of individual changes in daptomycin clearance over the therapeutic drug monitoring period versus corresponding changes in renal function ($n = 46$ pairs).

Ertapénème (Invanz®)

- **Large spectre**

- Gram-positifs

- Pneumocoques
- Staphylocoques
- Streptocoques
- Inactif sur les entérocoques

- Gram négatifs

- *Haemophilus influenzae*
- **Entérobactéries**
 - y compris BLSE
 - y compris céphalosporinase dérégulée
- Inactifs sur :
 - *P. aeruginosa*
 - *Acinetobacter spp.*
 - *Stenotrophomonas maltophilia*

- Anaérobies

AMM

1g/j par voie IV

Infections intra-abdominales.

Pneumonies communautaires.

Infections gynécologiques aiguës.

Infections de la peau et des tissus mous du pied chez le diabétique

Pharmacokinetics of Ertapenem following Intravenous and Subcutaneous Infusions in Patients[∇]

Denis Frasca,^{1,3} Sandrine Marchand,^{1,2,3} Franck Petitpas,^{1,3} Claire Dahyot-Fizelier,^{1,2,3}
William Couet,^{1,2,3*} and Olivier Mimoz^{1,2,3}

INSERM, ERI-23, Pôle Biologie Santé, 40 Avenue du Recteur Pineau, Poitiers, France¹; Université de Poitiers, UFR Médecine-Pharmacie, 6 Rue de la Milétrie, Poitiers, France²; and CHU Poitiers, 2 Rue de la Milétrie, Poitiers, France³

Diffusion of ertapenem into bone and synovial tissues

E. Boselli^{1*}, D. Breilh², S. Djabarouti², J. C. Bel¹, M. C. Saux² and B. Allaouchiche¹

¹*Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Édouard Herriot, Lyon, France;*

²*Clinical Pharmacokinetics Laboratory, Haut-Lévêque Hospital, Pessac, France*

HORS
AMM

Ertapénème (Invanz®) et IOA

HORS
AMM

Echecs !

Lee et al. *Int J Infect Dis* 2010

Elliott et al. *Clin Infect Dis* 2006

Skurnik et al. *J Med Microbiol* 2010

**HORS
AMM**

Ertapénème (Invanz®) et IOA

**HORS
AMM**

**1g 2x/j
IV ou SC
80-100%**

**Hors
AMM**

Ertapénème (invanz®)

50cc sérum physiologique
Injection SC lente
chez un patient n'ayant pas
d'anticoagulation curative

T. Ferry

Hors AMM

**Pas d'injection
SC directe**

T. Ferry

Prolonged subcutaneous high dose (1 g bid) of Ertapenem as salvage therapy in patients with difficult-to-treat bone and joint infection.

Ferry T, Sénéchal A, Gagnieu MC, Boibieux A, Laurent F, Perpoint T, Tod M, Chidiac C.

17 patients

Durée moyenne de 3 mois

Plus de 1000 injections SC

$t_{1/2}$ estimée à 5,9h (IQR 5,1-7,6)
3,8 h pour 1g IV 1x/j

Population pharmacokinetics and probability of target attainment of ertapenem administered by subcutaneous or intravenous route in patients with bone and joint infection

Sylvain Goutelle^{1-3*}, Florent Valour^{2,4,5}, Marie-Claude Gagnieu⁶, Frédéric Laurent^{2,5}, Christian Chidiac^{2,4,5} and Tristan Ferry^{2,4,5} on behalf of the Lyon Bone and Joint Infection Study Group†

IOA chronique

- Une des maladies infectieuses **les plus difficiles à traiter**
- Mise en jeu des mécanismes bactériens de **persistance**
- **Séquestre** dans l'ostéomyélite chronique
- **Biofilm à la surface d'un implant**

Infectiologue

VS.

Orthopédiste

IOA chronique

- Une des maladies infectieuses **les plus difficiles à traiter**
- Mise en jeu des mécanismes bactériens de **persistance**
- **Séquestre** dans l'ostéomyélite chronique
- **Biofilm à la surface d'un implant**

Challenge

Eradiquer la bactérie

Infectiologue

PRO

VS.

CON

Challenge

Limiter la perte osseuse

Orthopédiste

IOA chronique

- Une des maladies infectieuses **les plus difficiles à traiter**
- Mise en jeu des mécanismes bactériens de **persistance**
- **Séquestre** dans l'ostéomyélite chronique
- **Biofilm à la surface d'un implant**

Challenge
Eradiquer la bactérie

Challenge
Limiter la perte osseuse

Infectiologue

PRO

Orthopédiste

Guérir de l'infection

Incompatible

CON

Maintenir la fonction

'Persisters' dans les IOA chroniques

“Bacterial cells that escape the effects of antibiotics without undergoing genetic change”

Intracellular survival

**Antibiotiques
conventionnels
&
Chirurgie
conservatrice**

Biofilm formation

S. aureus

Osteoblast

Osteocyte

Osteoclast

Implant

Haut risque d'échec

Courtesy
J. Josse

Cas clinique #1

Homme de 71 ans
Vitiligo, coronarien

Infection **chronique** à
S. epidermidis multirésistant
sans relais oral possible

Fistule, **fonction conservée**

Arthrotomie-lavage '**DAIR**'
Antibiothérapie suppressive

Ferry T. et al.

Open Forum Infectious Diseases 2018

Cas clinique #1

Homme de 71 ans
Vitiligo, coronarien

Infection **chronique** à
S. epidermidis multirésistant
sans relais oral possible

Fistule, **fonction conservée**

Arthrotomie-lavage '**DAIR**'
Antibiothérapie suppressive

Ferry T. et al.
Open Forum Infectious Diseases 2018

Cas clinique #1

Homme de 71 ans
Vitiligo, coronarien

Infection **chronique** à
S. epidermidis multirésistant
sans relais oral possible

Fistule, **fonction conservée**

Arthrotomie-lavage '**DAIR**'
Antibiothérapie suppressive

Ferry T. et al.

Open Forum Infectious Diseases 2018

Cas clinique #2

Homme de 82 ans, Obésité

Infection post-op PTG charnière à *P. aeruginosa*

Pas de traitement oral possible

DAIR itératifs, lambeau

Echec avec nécrose

infection persistante sur PTG à *P. aeruginosa*

Cas clinique #2

Homme de 82 ans, Obésité

Infection post-op **PTG charnière** à *P. aeruginosa*

Pas de traitement oral possible

DAIR itératifs, lambeau

Echec avec nécrose

infection persistante sur PTG à
P. aeruginosa

Explantation pour
guérir de l'infection
mais perte
considérable de
fonction

VS.

DAIR itératif +
Substitut dermique
+ **antibiothérapie**
suppressive

Subcutaneous suppressive antibiotic therapy for bone and joint infections: safety and outcome in a cohort of 10 patients

Journal of Antimicrobial Chemotherapy

Ceftazidime

**En PERFUSION
SOUS-CUTANÉE 1x/j
Antibiothérapie suppressive**

Le patient n'est pas guéri

Mais la fonction est conservée !

Innovation = thérapie locale

Antibiotique administré par voie systémique

Antibiotique administré par voie locale en utilisant des transporteurs (substitut osseux)

Cas clinique #3

Homme de 32 ans

Infection post-traumatique **récurrente** sur ostéosynthèse à *P. aeruginosa* malgré des reprises itératives **avec ablation du matériel**

Pseudarthrose septique **récurrente** à *P. aeruginosa*

Amputation

VS.

Réséction osseuse
+ traitement **anti-**
infectieux innovant
et **reconstruction**
osseuse

Cas clinique #3

Homme de 32 ans

Infection post-traumatique **récidivante** sur ostéosynthèse à *P. aeruginosa* malgré des reprises itératives **avec ablation du matériel**

Pseudarthrose septique récidivante à *P. aeruginosa*

Décision multidisciplinaire :

1st step: Résection osseuse + spacer

2nd step: Lambeau gastrocnémien

3rd step: Ostéosynthèse + reconstruction avec CERAMENT™ G et CERAMENT™ V + autogreffe + allogreffe

Cas clinique #3

Homme de 32 ans

Infection post-traumatique **récidivante** sur ostéosynthèse à *P. aeruginosa* malgré des reprises itératives **avec ablation du matériel**

Pseudarthrose septique récidivante à *P. aeruginosa*

Décision multidisciplinaire :

1st step: Résection osseuse + spacer

2nd step: Lambeau gastrocnémien

3rd step: Ostéosynthèse + reconstruction avec CERAMENT™ G et CERAMENT™ V + autogreffe + allogreffe

Cas clinique #3

CE

Disponible sur le marché comme un DISPOSITIF (pas comme un antibiotique)
MAIS pas d'essai clinique
Pas de remboursement

Décision multidisciplinaire :

1st step: Résection osseuse + spacer

2nd step: Lambeau gastrocnémien

3rd step: Ostéosynthèse + reconstruction avec CERAMENT™ G et CERAMENT™ V + autogreffe + allogreffe

Evaluation de l'efficience du substitut osseux délivrant localement de la gentamicine CERAMENT G® dans le traitement de l'ostéomyélite chronique des os long : essai clinique national multicentrique CONVICTION

Faisabilité faite via le CS des CRIOAc

Osteomyélite chronique stade III

Randomisation

SOC

Chirurgie (curetage endomédullaire +/- lambeau)

+ antibiotique 3 mois

SOC

Chirurgie (curetage endomédullaire +/- lambeau)

+ CERAMENT G®

+ antibiotique 3 mois

Evaluation de l'efficacité du substitut osseux délivrant localement de la gentamicine CERAMENT G® dans le traitement de l'ostéomyélite chronique des os long : essai clinique national multicentrique CONVICTION

Nom	Prénom	Ville	Email	Nom du CRIOAc	Spécialité
Batailler	Cécile	Lyon	cecile.batailler@chu-lyon.fr	CRIOAc Lyon	Chirurgie orthopédique
Fessy	Michel	Lyon	michel.fessy@chu-lyon.fr	CRIOAc Lyon	Chirurgie orthopédique
Senneville	Eric	Lille-Tourcoing	senneric670@gmail.com	CRIOAc G4	Maladies Infectieuses
Thomas	Bauer	Boulogne-Billancourt	thomas.bauer@aphp.fr	CRIOAc de Paris	Chirurgie orthopédique
Simon	Marmor	Paris	SMarmor@hopital-dcss.org	CRIOAc de Paris	Chirurgie orthopédique
Mainard	Didier	Nancy	didier.mainard@univ-lorraine.fr	CRAIOc Grand-Est	Chirurgie orthopédique
Dauchy	Frederic-Antoin	Bordeaux	frederic.dauchy@chu-bordeaux.fr	CRIOAc GSO	Maladies Infectieuses
Louis-Etienne	Gayet	Poitiers	louis-etienne.gayet@chu-poitiers.fr	CRIOGO	Chirurgie orthopédique
Sophie	Touchais	Nantes	sophie.touchais@chu-nantes.fr	CRIOGO	Chirurgie orthopédique
Pauline	Sergent	Besançon	paulinesergent@gmail.com	CRIOAc de Besançon	Chirurgie orthopédique
Thomas	Williams	Brest	thomas.williams@chu-brest.fr	CRIOGO	Chirurgie orthopédique
Nicolas	Cellier	Nimes	nicolas.cellier@chu-nimes.fr	CRIOAc de Nimes	Chirurgie orthopédique
Goulven	Rochcongar	Caen	rochcongar-g@chu-caen.fr	CRIOAc G4	Chirurgie orthopédique
Benoit	Brunschweiler	Amiens	Brunschweiler.Benoit@chu-amiens.fr	CRIOGO	Chirurgie orthopédique
Pierre	Delobel	Toulouse	pierre.delobel@chu-toulouse.fr	CRIOAc de Toulouse	Maladies Infectieuses

Porous Alumina Ceramic as a vector for local antibiotic delivery

Eric DENES¹, François BERTIN², Guislaine BARRIERE¹, Evelyne POLI¹, Guillaume LEVEQUE¹, Christian WOLOCH³

1 I.Ceram, Limoges, France 2 Thoracic Surgery, Dupuytren Teaching Hospital, Limoges, France

3 Pharmacology laboratory, Dupuytren Teaching Hospital, Limoges, France

Céramique d'alumine poreuse

Large utilisation dans les situations non septiques

Colonisation par les ostéoblastes

Excellentes propriétés mécaniques

Non résorbable, prévoir la fabrication en amont, délai

Céramique d'alumine poreuse + Gentamicine

Sternum

Les Bacteriophages ont une activité sur les '*persisters*' (notamment dans le biofilm)

Potentiel considérable de l'approche anti-infectieuse pour conserver la fonction

- **Antibiothérapie suppressive**

- Orale (molécules potentiellement hors AMM)
- Sous-cutanée (voie d'administration hors AMM)

- **Antibiothérapie locale**

- Substituts osseux aux antibiotiques (Genta ou Vanco, non remboursés)
- Ciments industriels aux antibiotiques (Genta+Vanco, non remboursés)

- **Autres anti-infectieux utilisable localement**

- Bactériophages (utilisation compassionnelle)

- **Pertinence microbiologique et de l'indication clinique**

• **Passer du case report aux essais thérapeutiques**

• **Réseau CRIOAc pour évaluer ces innovations potentielles**

- Infection communautaire et nosocomiale **grave**
- Impact **fonctionnel** constant, **récidives** fréquentes, **risque d'amputation**
- Antibiothérapie prolongée souvent précédée de chirurgie
- Notion d'**IOA complexes**
- CRIOAc
 - Organisation des RCP
 - Stratégies de prises en charge
 - Expérience de l'antibiothérapie hors AMM
 - Innovations thérapeutiques
 - Essais thérapeutiques

<http://www.crioac-lyon.fr>

- Published cases
- Open access studies in pdf
- All thesis in pdf
- **Newsletter**

Journée

<http://ioa2020.univ-lyon1.fr>

SAVE THE DATE
Vendredi 3 avril
2020

Florent VALOUR (Lyon)

Apport des modèles animaux dans la prise en charge des IOA

Camille KOLENDA (Lyon)

Diagnostic microbiologique des IOA par métagenomique

Jérôme JOSSE (Lyon)

Intérêt microbiologique de la combinaison antibiotique dans les ciments PMMA

Hassan SERRIER (Lyon)

Analyse du coût de la surinfection lors du changement de prothèse en 2 temps

Patricia PAVESE (Grenoble)

Antibiotique de longue durée d'action : Expérience de la dalbavancine au CHU de Grenoble

Emmanuel FORESTIER (Chambéry) et Sylvain GOUTELLE (Lyon)

Place des dosages d'antibiotiques dans la PEC des IOA

Tristan FERRY (Lyon)

Bactériophage et infection de prothèse : le concept émergent du « Phago-DAIR »

Olivier BORENS (Lausanne)

Le « DAIR » dans les infections de prothèses

<http://www.crioac-lyon.fr>